Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2157101	A01AB09	mikonazol	DAKTANOL	oralni gel	tuba, 1 po 40 g 2%	Galenika a.d.	Republika Srbija	240.10	0,2 g	60.03	50.00		
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	234.20	20 mg	15.61	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d d	Republika Srbija	218.60	20 mg	15.61	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	218.60	20 mg	15.61	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	234.20	20 mg	15.61	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	133.50	40 mg	9.54	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	133.50	40 mg	9.54	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	267.00	40 mg	9.54	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	218.70	30 mg	15.62	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225.90	30 mg	16.14	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	76.20	30 mg	16.33	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	152.40	30 mg	16.33	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	304.80	30 mg	16.33	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	124.10	30 mg	13.30	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	248.20	30 mg	13.30	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	496.50	30 mg	13.30	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1124301	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	142.70	30 mg	14.27	50.00		
3124300	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	84.90	30 mg	25.47	50.00		
1124303	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	tableta	blister, 40 po 10 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa Senofi-Aventis, Francuska	Republika Makedonija	190.20	30 mg	14.27	50.00		
1124532	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 4 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	959.10	16 mg	383.64	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124534	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 8 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1,543.90	16 mg	308.78	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	film tableta	blister, 15 po 8 mg	Vianex S.A. - Plant B'	Grčka	2,315.80	16 mg	308.77	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124100	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 10 po 1 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	2,246.00	2 mg	449.20	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124104	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister. 5 po 2 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	2,947.10	2 mg	589.42	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124586	A04AA02	granisetron	KYTRIL	film tableta	blister, 10 po 1 mg	IL CSM Clinical Supplies Management; Waymade PLC	Nemačka, Velika Britanija	2,246.00	2 mg	449.20	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1127177	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2,338.10	0,75 g	70.14	50.00	1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister. 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,169.00	0,75 g	70.14	50.00	1 Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3127050	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	sirup	1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	428.50	6,7 g	8.61	50.00	1. Portosistemske encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127426	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA RP	sirup	boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	428.50	6,7 g	8.61	50.00	1. Portosistemske encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3126303	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	oralna suspenzija	bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	243.50	600 mg	40.58	50.00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
3126000	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Makedonija	243.50	600 mg	40.58	50.00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana	Samo za decu.
1126401	A07DA03	loperamid	LOPERAMID	tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	189.90	10 mg	47.48	50.00		
1129930	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 100 po 3 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	9,178.40	9 mg	275.35	50.00	1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50). 2. Autoimuni hepatitis (K75.4)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa užom specijalizacijom iz gastroenterohepatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1129490	A07EC01	sulfasalazin	SALAZOPYRIN-EN	gastrorezistentna tableta	boca plastična, 100 po 500 mg	Recipharm Uppsala AB	Švedska	1,085.10	2 g	42.60	50.00		
1129300	A07EC02	mesalazin	5-ASA	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	919.60	1,5 g	55.18	50.00	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129303	A07EC02	mesalazin	5-ASA	supozitorija	blister, 30 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	960.50	1,5 g	192.10	50.00	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51)	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121153	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	594.50	4 kapsule	118.90	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84) 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz potvrđenjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121154	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 50 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1,486.30	4 kapsule	118.90	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84) 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz potvrđenjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121155	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	2,972.50	4 kapsule	118.90	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84) 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz potvrđenjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121163	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kutija, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	594.50	4 kapsule	118.90	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84) 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz potvrđenjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121152	A09AA02	pankreatin	KREON 10 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejener plastični, 100 po 150 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1,172.70	6 kapsula	70.36	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84) 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz potvrđenjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
0041559	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID PENFILL	rastvor za injekciju u ulošku	uložak 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2,325.50	40 i.j.	62.01	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041425	A10AB01	insulin humani	HUMULIN R	rastvor za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2,325.50	40 i.j.	62.01	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041563	A10AB01	insulin humani	INSUMAN RAPID SOLOSTAR	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2,325.50	40 i.j.	62.01	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041507	A10AB04	insulin lispro	HUMALOG	rastvor za injekciju u ulošku	uložak 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3,025.30	40 i.j.	80.67	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg. odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije(glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041532	A10AB05	insulin aspart	NOVO RAPID	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2,083.30	40 j.	82.53	50.00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041527	A10AB05	insulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3,670.80	40 j.	97.89	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg. odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije(glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina. - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041556	A10AB06	insulin glulizin	APIDRA SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3,386.90	40 i.j.	89.78	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg. odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije(glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041557	A10AC01	insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)	INSULATARD PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2,500.70	40 i.j.	66.69	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041428	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2,500.70	40 i.j.	66.69	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041564	A10AC01	humani insulin	INSUMAN BAZAL SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2,500.70	40 i.j.	66.69	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041558	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2,187.10	40 i.j.	58.32	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041565	A10AD01	insulin humani	INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2,046.70	40 i.j	54.58	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041427	A10AD01	insulin humani	HUMULIN M3	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2,187.10	40 i.j.	58.32	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041502	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak. 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3,025.30	40 i.j.	80.67	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijente u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju, - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju, - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili internisteili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2 Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041503	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak. 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3,025.30	40 i.j.	80.67	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijente u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju, - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju, - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili internisteili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041528	A10AD05	insulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska, Francuska	3,670.80	40 j.	97.89	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l. 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijente u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041555	A10AE04	insulin glargin	LANTUS SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4,614.60	40 i.j.	123.06	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompilijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041668	A10AE04	insulin glargin	TOUJEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom Solostar, 3 po 1.5ml (300j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4,224.10	40 i.j.	125.16	50.00		Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veci od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrduje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041667	A10AE04	insulin glargin	ABASAGLAR	rastvor za injekciju u ulošku	uložak. 5 po 3 ml (100 j./ml)	Lilly France	Francuska	3,589.10	40 i.j	95.71	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041550	A10AE05	insulin detemir	LEVEMIR FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	5,676.90	40 j.	151.38	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041206	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./ml)	NOVO NORDISK A/S	Danska	5,877.50	40 j	156.73	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili internista ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041207	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 3 po 3 ml (200 j./ml)	NOVO NORDISK A/S	Danska	7,053.00	40 j	156.73	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili internista ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
1043060	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	79.60	2 g	10.61	50.00		
1043062	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	122.40	2 g	8.16	50.00		
1043070	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.60	2 g	10.61	50.00		
1043071	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	tegla, 30 po 850 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	95.00	2 g	7.45	50.00		
1043107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITTAL; Famar Lyon	Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska	122.40	2 g	8.16	50.00		
1043116	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Velika Britanija; Bugarska	79.60	2 g	10.61	50.00		
1043117	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Balkanpharma-Dupnitsa ad	Bugarska	122.40	2 g	8.16	50.00		
1042332	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 3,5	tableta	blister, 30 po 3,5 mg	Berlin-Chemie (Menarini group)	Nemačka	95.80	7 mg	6.39	50.00		
1042076	A10BB09	gliklazid	GLIKOSAN	tableta	blister, 30 po 80 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	178.90	60mg	4.47	50.00		
1042070	A10BB09	gliklazid	GLIORAL	tableta	blister, 30 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	178.90	60mg	4.47	50.00		
1042065	A10BB09	gliklazid	DIPRIAN	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	178.90	60mg	4.47	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1042311	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042312	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	134.70	2 mg	2.99	50.00		
1042313	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	149.70	2 mg	2.50	50.00		
1042830	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	102.70	2 mg	6.85	50.00		
1042831	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042832	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	134.70	2 mg	2.99	50.00		
1042833	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	149.70	2 mg	2.50	50.00		
1042834	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 6 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	370.50	2 mg	4.12	50.00		
1042001	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	tableta	blister, 30 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042004	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	tableta	blister, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	134.70	2 mg	2.99	50.00		
1042003	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	tableta	blister, 30 po 4 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	149.70	2 mg	2.50	50.00		
1042314	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 1 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	102.70	2 mg	6.85	50.00		
1042315	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 2 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042316	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 3 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	134.70	2 mg	2.99	50.00		
2050087	A11CC05	holekalciferol	VIGANTOL ULJE	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapalijkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)	Merck KGaA	Nemačka	198.90	20 mcg	0.80	50.00		Samo za decu.
1053075	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	tableta	tegla, 50 po 1 g	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	345.50	3 g	20.73	50.00		
2053247	A12BA01	kalijum-hlorid	KALII CHLORIDI	prašak za oralni rastvor	kesica. 10 po 1g	Ufar d.o.o	Republika Srbija	122.70	3g	36.81	50.00		Uz diuretike Henleove petlje, nakon bolničkog lečenja. na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.
1063115	B01AA03	varfarin	FARIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	115.00	7,5 mg	5.75	50.00		
3060073	B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks	FERRUM SANDOZ	sirup	1 po 100 ml (50 mg/5 ml)	Lek farmaceutska družba d.d. u saradnji sa Vifor Inc, Švajcarska	Slovenija	236.40	90 mg	21.28	50.00		
3060072	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena. 100 ml (50 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	236.40	90 mg	21.28	50.00		
3060074	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena. 100 ml (100 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	526.70	90 mg	23.70	50.00		
3060050	B03AB09	gvožđe (III)-proteinsukciniat	LEGOFER	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)	Alkaloid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.P.A, Italija	Republika Makedonija	282.90	-	-	50.00		
1061040	B03BB01	folna kiselina	FOLNAK	tableta	kontejner za tablete, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	117.30	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061050	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT	Republika Srbija	117.30	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061021	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d o o	Republika Srbija	117.30	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1100252	C01AA05	digoksin	DILACOR	tableta	blister, 20 po 0.25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	82.30	0,25 mg	4.12	50.00		
1100254	C01AA05	digoksin	DIGOXICOR	tableta	blister, 50 po 0.25 mg	Sopharma Pharmaceuticals AD	Bugarska	185.20	0,25 mg	3.70	50.00		
1101130	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister. 50 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	319.20	0,3 g	12.77	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101131	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister. 50 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	690.10	0,3 g	13.80	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101402	C01BD01	amjodaron	AMIODARON	tableta	blister. 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	800.00	0,2 g	13.33	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101440	C01BD01	amjodaron	SEDACORON	tableta	blister, 50 po 200 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	466.10	0,2 g	9.32	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1101354	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	tableta	blister. 30 po 200 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	400.00	0,2 g	13.33	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1101403	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	tableta	blister. 60 po 200 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	800.00	0.2 g	13.33	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1102101	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLICERIN	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0,5 mg	Jaka-80 Radoviš a.d.	Republika Makedonija	119.20	2,5 mg	14.90	50.00		
1102102	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLICERIN UNION	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0,5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	119.20	2,5 mg	14.90	50.00		
1102060	C01DA08	izosorbid dinitrat	ISOSORB RETARD	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	226.00	60 mg	11.30	50.00		
1102082	C01DA08	izosorbid dinitrat	CORNILAT	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.70	60 mg	11.96	50.00		
1102450	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister. 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	114.70	40 mg	7.65	50.00		
1102452	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186.30	40 mg	6.21	50.00		
1102302	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	114.70	40 mg	7.65	50.00		
1102300	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	186.30	40 mg	6.21	50.00		
1102471	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOCARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 50 po 60 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	728.40	40mg	9.71	50.00		
1102522	C01DX12	molsidomin	LOPION FORTE	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	180.60	-	-	50.00	Angina pektoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.	
1102520	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 30 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	125.70	-	-	50.00		
1102521	C01DX12	molsidomin	MOLICOR RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 8 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	256.60	-	-	50.00	Teška (ozbiljna) angina pektoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina.	
1102519	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 60 po 2 mg	Union-Medic d.o.o Novi Sad	Republika Srbija	251.40	-	-	50.00		
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	169.20	2 g	67.68	50.00	Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.
1103911	C02KX01	bosentan	TRACLEER	film tableta	blister. 56 po 125 mg	Actelion Pharmaceuticals LTD	Švajcarska	162,021.10	0,25 g	5,786.47	50.00	Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103374	C02KX01	bosentan	CARDISTEPS	film tableta	blister, 60 po 125 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	43,298.60	0,25 g	1,443.29	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
1103379	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 62,5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	33,727.40	0,25 g	2,409.10	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103378	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister. 56 po 125 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	40,412.00	0,25 g	1,443.29	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103380	C02KX01	bosentan	IPERTAZIN	film tableta	blister, 56 po 62,5 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	33,727.40	0,25 g	2,409.10	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103381	C02KX01	bosentan	IPERTAZIN	film tableta	blister. 56 po 125 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	40,412.00	0,25 g	1,443.29	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0, I27.2, I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1400410	C03AA03	hidrohlortiazid	DIUNORM	tableta	blister, 20 po 25 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	103.50	25 mg	5.18	50.00		
1400142	C03CA01	furosemid	LASIX	tableta	blister, 12 po 40 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	58.50	40 mg	4.88	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400473	C03CA01	furosemid	FUROSEMID BELUPO	tableta	blister, 20 po 40 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	87.70	40 mg	4.39	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400001	C03CA01	furosemid	FUROSEMIDUM POLFARMEX	tableta	blister, 30 po 40 mg	Polfarmex S.A.	Poljska	131.50	40 mg	4.38	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400041	C03CA02	bumetanid	YURINEX	tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	208.00	1 mg	10.40	50.00		
1400440	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	296.80	75 mg	22.26	50.00		
1400441	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister. 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	566.90	75 mg	14.17	50.00		
1401290	C03EA..	metiklotiazid, amilorid	LOMETAZID	tableta	blister, 30 po (5 mg +10 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	147.10	1 tablete	4.90	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1400400	C03EA01	hidrohlortiazid, amilorid	HEMOPRES	tableta	blister, 40 po (50 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	173.90	1 tableta	4.35	50.00		
1107183	C07AA05	propranolol	PROPRANOLOL	tableta	blister. 50 po 40 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	133.40	0,16 g	10.67	50.00		
1107496	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister. 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	154.30	0,15 g	7.72	50.00		
1107750	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74.50	0,15 g	7.98	50.00		
1107751	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	148.90	0,15 g	7.98	50.00		
1107580	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 50	tableta	blister, 30 po 50 mg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	79.80	0,15 g	7.98	50.00		
1107582	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 100	tableta	blister. 30 po 100 mg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	154.30	0,15 g	7.72	50.00		
1107170	C07AB03	atenolol	PRINORM	tableta	blister. 14 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	97.50	75 mg	5.22	50.00		
1107500	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	tableta	blister, 14 po 100 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	97.50	75 mg	5.22	50.00		
1107042	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	100.90	10 mg	13.45	50.00		
1107020	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107021	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107023	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107022	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107026	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.	Republika Srbija; Poljska	100.90	10 mg	13.45	50.00		
1107027	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.	Republika Srbija; Poljska	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107025	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.	Republika Srbija; Poljska	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107035	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	100.90	10 mg	13.45	50.00		
1107036	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107037	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107048	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107049	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107605	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 1.25 mg	Merck S.L; Merck KGaA&Co.WERK SPITTAL; Merck KGaA	Španija; Austrija;Nemačka	198.00	10 mg	52.80	50.00		
1107060	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 2,5 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	100.90	10 mg	13.45	50.00		
1107061	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 5 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107062	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 10 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107501	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 5 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107502	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107606	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 3.75 mg	Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	313.20	10 mg	27.84	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	136.60	37,5 mg	13.66	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa
1107659	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12.5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	136.60	37.5 mg	13.66	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa
1107658	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	210.60	37.5 mg	10.53	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa
1107673	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 6.25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	159.70	37,5 mg	34.22	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	127.50	37,5 mg	13.66	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	136.60	37,5 mg	13.66	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	210.60	37,5 mg	10.53	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa
1107024	C07BB07	bisoprolol, hidrohlortiazid	TENSEC plus	film tableta	blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186.50	1 tableta	6.22	50.00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402140	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	50.40	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402141	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	61.10	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402139	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1 Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402142	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	91.60	5mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402146	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	50.40	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2 Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402147	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 10 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	61.10	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402850	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1 Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402851	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402956	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402833	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402852	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402853	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402000	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	50.40	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402001	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 20 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	61.10	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402666	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 30 po 5mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1 Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402002	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 30 po 10mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402878	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402877	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402874	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN SANDOZ	tableta	blister, 30 po 5 mg	Lek Farmacevtska Družba d.d.	Slovenija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402876	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN SANDOZ	tableta	blister, 30 po 10 mg	Lek Farmacevtska Družba d.d.	Slovenija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402481	C08CA05	nifedipin	NIFELAT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	167.40	30 mg	8.37	50.00		
1402703	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	68.40	0,24 g	13.68	50.00		
1402704	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 50 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	154.70	0,24 g	9.28	50.00		
1402721	C08DA01	verapamil	IZOPAMIL	film tableta	blister, 45 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	139.20	0,24 g	9.28	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1402120	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	68.40	0,24 g	13.68	50.00		
1402121	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 80 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	92.80	0,24 g	9.28	50.00		
1402250	C08DB01	diltiazem	CORTIAZEM RETARD	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	204.30	0,24 g	18.16	50.00		
1402203	C08DB01	diltiazem	DILTIAZEM ALKALOID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Alkaloid a.d. Skopje; Alkaloid d.o.o. Beograd	Republika Makedonija; Republika Srbija	204.30	0,24 g	18.16	50.00		
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132.50	50 mg	6.63	50.00		
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	265.00	50 mg	6.63	50.00		
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister. 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	132.50	50 mg	6.63	50.00		
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister. 40 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	265.00	50 mg	6.63	50.00		
1103578	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d	Republika Srbija	148.40	10 mg	4.95	50.00		
1103579	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d	Republika Srbija	297.10	10 mg	4.95	50.00		
1103178	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	148.40	10 mg	4.95	50.00		
1103176	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	297.10	10 mg	4.95	50.00		
1103886	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	98.90	10 mg	4.95	50.00		
1103885	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	198.10	10 mg	4.95	50.00		
1103204	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 5mg	Krka D.D.	Slovenija	61.80	10mg	6.18	50.00		
1103200	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg	Krka D.D.	Slovenija	98.90	10mg	4.95	50.00		
1103202	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg	Krka D.D.	Slovenija	198.10	10mg	4.95	50.00		
1103988	C09AA02	enalapril	ENATENS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	148.40	10 mg	4.95	50.00		
1103987	C09AA02	enalapril	ENATENS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	297.10	10 mg	4.95	50.00		
1103565	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	80.50	10 mg	4.03	50.00		
1103566	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	198.00	10 mg	4.95	50.00		
1103567	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	120.80	10 mg	4.03	50.00		
1103568	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	297.00	10 mg	4.95	50.00		
1103550	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 5 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	88.00	10 mg	5.87	50.00		
1103551	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister. 30 po 20 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	297.00	10 mg	4.95	50.00		
1103867	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	58.70	10 mg	5.87	50.00		
1103866	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	80.50	10 mg	4.03	50.00		
1103865	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	198.00	10 mg	4.95	50.00		
1103873	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	120.80	10 mg	4.03	50.00		
1103874	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	297.00	10 mg	4.95	50.00		
1103018	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	202.80	2,5 mg	3.38	50.00		
1103722	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 2.5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	108.70	2,5 mg	3.88	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103723	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	189.30	2,5 mg	3.38	50.00		
1103724	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Sanofi S.P.A	Italija	271.50	2,5 mg	2.42	50.00		
1103012	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 1.25 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad, Actavis LTD ; Actavis EHF	Republika Srbija, Bugarska; Malta; Island	86.50	2,5 mg	6.18	50.00		
1103013	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD ; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	108.70	2,5 mg	3.88	50.00		
1103083	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD ; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	189.30	2,5 mg	3.38	50.00		
1103082	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD ; Actavis EHF	Republika Srbija, Bugarska; Malta; Island	271.50	2,5 mg	2.42	50.00		
1103256	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	116.50	2,5 mg	3.88	50.00		
1103260	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 5mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	202.80	2,5 mg	3.38	50.00		
1103264	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	290.90	2.5 mg	2.42	50.00		
1103286	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 2.5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	108.70	2,5mg	3.88	50.00		
1103287	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	189.30	2,5mg	3.38	50.00		
1103285	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	271.50	2,5mg	2.42	50.00		
1103026	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 2.5mg	Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	108.70	2,5 mg	3.88	50.00		
1103025	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 5mg	Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	189.30	2,5 mg	3.38	50.00		
1401503	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	PRILENAP H	tableta	blister, 30 po (10 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	264.80	1 tableta	8.83	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401499	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	PRILENAP HL	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	221.90	1 tableta	7.40	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401504	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENATENS PLUS	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	249.80	1 tableta	12.49	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401505	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENATENS PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	374.70	1 tableta	12.49	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401082	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	374.70	1 tableta	12.49	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401083	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 6 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	334.40	1 tableta	11.15	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401140	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENAP- H	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+25mg)	Krka D.D.	Slovenija	176.50	1 tableta	8.83	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401175	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENAP- HL	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+12,5mg)	Krka D.D.	Slovenija	147.90	1 tableta	7.40	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401178	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENAP -HL 20	tablete	20 po (20mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	249.80	1 tableta	12.49	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401171	C09BA03	lizinopril. hidrohlortiazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	132.20	1 tableta	6.61	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401172	C09BA03	lizinopril. hidrohlortiazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d	Bosna i Hercegovina	249.70	1 tableta	12.49	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401182	C09BA03	lizinopril. hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija, Republika Makedonija	374.60	1 tableta	12.49	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401922	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	198.40	1 tableta	6.61	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401923	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 25 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	427.30	1 tableta	14.24	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401131	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	AMPRIL HD	tableta	28 po (5 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401013	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITACE COMP	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401012	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITACE COMP LS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401908	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	VIVACE PLUS L	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401909	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	VIVACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401931	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401932	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401130	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	AMPRIL- HL	tablete	blister, 28 po (2.5mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103028	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5mg+12,5mg)	Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103027	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5mg+25mg)	Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	230.60	30 mg	11.53	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132.10	30 mg	13.21	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d,	Slovenija	123.30	30 mg	13.21	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	215.30	30 mg	11.53	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	353.10	30 mg	9.46	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	132.10	30 mg	13.21	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	230.60	30 mg	11.53	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	378.30	30 mg	9.46	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	284.70	30 mg	14.24	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	438.60	30 mg	10.97	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	284.70	30 mg	14.24	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104486	C10AA03	pravastatn	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	438.60	30 mg	10.97	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	476.40	20 mg	7.94	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	239.30	20 mg	15.95	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	402.00	20 mg	13.40	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	476.40	20 mg	7.94	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	239.30	20mg	15.95	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	402.00	20mg	13.40	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	476.40	20mg	7.94	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	476.40	20 mg	7.94	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Lek Farmacevtska Družba D.D.	Slovenija	239.30	20 mg	15.95	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 20 mg	Lek Farmacevtska Družba D.D.	Slovenija	402.00	20 mg	13.40	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	196.60	10 mg	14.04	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	446.90	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	540.30	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	527.20	10 mg	4.71	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104742	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104739	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	196.60	10 mg	14.04	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D. Vršac	Republika Srbija	210.60	10mg	14.04	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D. Vršac	Republika Srbija	478.80	10mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D. Vršac	Republika Srbija	578.90	10mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104590	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	196.60	10mg	14.04	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104591	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	446.90	10mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104592	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis Ltd.	Malta	540.30	10mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104593	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Actavis Ltd.	Malta	527.20	10mg	4.71	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104665	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemačka; Slovačka	564.90	10 mg	4.71	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104470	C10AB08	ciprofibrat	LIPANOR	kapsula, tvrda	blister. 30 po 100 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	351.70	0,1 g	11.72	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1104480	C10AX09	ezetimib	EZOLETA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	1,657.70	10 mg	55.26	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104477	C10AX09	ezetimib	EZACT	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	1,657.70	10 mg	55.26	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
4157100	D01AC02	mikonazol	DAKTANOL	krem	tuba,1 po 30 g 2%	Galenika a.d.	Republika Srbija	190.00	-	-	50.00		
4137000	D01AC02	mikonazol	ROJAZOL	krem	tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	190.00	-	-	50.00		
4150023	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	mast	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	236.60	-	-	50.00		
4151050	D06BA01	sulfadiazin	SANADERM	krem	tuba, 1 po 50 g 1%	Zdravlje a.d.; Hemofarm a.d.	Republika Srbija; Republika Srbija	274.50	-	-	50.00		
4152075	D07AA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast	tuba, 1 po 5 g (2,5%)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	71.30	-	-	50.00		
4152192	D07AC04	fluocinolonacetonid	SINODERM	gel	tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	128.20	-	-	50.00		
4152190	D07AC04	fluocinolonacetonid	SINODERM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	83.90	-	-	50.00		
4152191	D07AC04	fluocinolonacetonid	SINODERM	mast	tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	83.90	-	-	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4153221	D07CC02	fluocinolonacetonid, neomicin	SINODERM N	mast	tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	114.10	-	-	50.00		
4159350	D11AH02	pimekrolimus	ELIDEL	krem	tuba 1 po 15 g (1%)	Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co KG	Francuska; Nemačka	1,472.00	-	-	50.00	Atopijski dermatitis (L20).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
6137082	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	vaginalna	strip, 10 po 500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	172.60	0,5 g	17.26	50.00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137225	G01AF04	mikonazol	GINO-DAKTANOL	vaginalna	strip, 7 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	300.70	0,1 g	21.48	50.00	Vaginalna infekcija (N76)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
2141136	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)	Hemoferm a.d.	Republika Srbija	98.60	0,2 mg	7.89	50.00	1. Neoznačen pobačaj (O06); 2. Krvarenje posle porođaja (O72).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1135240	G03AA07	levonorgestrel, etinilestradiol	LEGRAVAN	film tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	214.10	0,75 tabl.	7.65	50.00	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister. 30 po 100 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	567.30	300 mg	56.73	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0). 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048462	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister. 14 po 200 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	567.30	300 mg	60.78	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0). 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiolvalerat	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO KG	Nemačka	191.20	0,75 tabl.	6.83	50.00	1. Primarna amenoreja (N91.0); 2. Sekundarna amenoreja (N91.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO KG	Francuska; Nemačka	2,223.70	0,1 g	88.95	50.00	Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
1139800	G04BE03	sildenafil	REVATIO	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Pfizer PGM	Francuska	24,255.50	50 mg	673.76	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
1139117	G04BE03	sildenafil	FIUMIN	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	24,255.50	50 mg	673.76	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
0044308	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	22,630.70	2 i.j.	1,508.71	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044309	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	33,946.20	2 i.j.	1,508.72	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece; 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1); 5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044241	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	46,132.10	2 i.j.	1,160.56	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044243	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u ulošku	uložak 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	20,674.50	2 i.j.	1,148.58	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044239	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	10,309.60	2 i.j.	1,296.81	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044236	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	20,876.60	2 i.j.	1,159.81	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044666	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak,1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	8,476.50	2 i.j.	1,130.20	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044664	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	16,729.80	2 i.j.	1,115.32	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044661	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	22,743.30	2 i.j.	1,010.81	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1) 6. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044100	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.03 ml (5.83 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	13,578.40	2 i.j.	1,507.48	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044101	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	27,156.90	2 i.j.	1,508.72	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044102	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 2.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	42,269.20	2 i.j.	1,408.97	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
7045080	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	sprej za nos, rastvor	bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3,098.30	25 mcg	154.92	50.00		
1045081	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	tableta	bočica plastična, 30 po 0,2 mg	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3,814.90	0,4 mg	254.33	50.00		
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1,953.10	240 mcg	260.41	50.00		Samo za decu
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3,884.60	240 mcg	258.97	50.00		Samo za decu
1047143	H02AB02	deksametazon	DEXASON	tableta	blister, 50 po 0,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	390.90	1,5 mg	23.45	50.00		
1047144	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 4 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1,246.60	1.5 mg	23.37	50.00		
1047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 8 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1,940.30	1.5 mg	18.19	50.00		
1047180	H02AB04	metilprednizolon	METILPREDNIZOLON UNION	tableta	blister, 20 po 8 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	417.40	7,5mg	19.57	50.00		
1047632	H02AB07	prednizon	PRONISON	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	300.00	10 mg	7.50	50.00		
1047511	H02AB07	prednizon	PREDNIZON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	59.50	10 mg	11.90	50.00		
1040050	H03AA01	levotiroksin natrijum	TIVORAL	tableta	blister, 50 po 100 mcg	Galenika a.d.	Republika Srbija	136.00	150 mcg	4.08	50.00		
1040230	H03AA01	levotiroksin natrijum	EUTHYROX	tableta	50 po 25 mcg	Merck KGaA	Nemačka	101.30	150 mcg	12.16	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1040190	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	20 po 50 mg	Alkaloid a.d	Republika Makedonija	143.20	0,1 g	14.32	50.00		
1040192	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	45 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	693.80	0,1 g	15.42	50.00		
1040120	H03BB02	tiamazol	TIASTAT	tableta	20 po 20 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	151.50	10 mg	3.79	50.00		
0341340	H04AA01	glukagon	GLUCAGEN HYPOKIT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1,668.00	1 mg	1668.00	50.00		
1022510	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	kapsula	5 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	74.40	0,1 g	14.88	50.00		
1022515	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74.40	0,1 g	14.88	50.00		
1021145	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister. 16 po 250 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	89.50	1 g	22.38	50.00		
1021148	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister. 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	117.80	1 g	14.73	50.00		
3021146	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	130.50	1 g	26.10	50.00		
1021965	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	kapsula, tvrda	blister. 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	117.80	1 g	14.73	50.00		
1021912	J01CA04	amoksicilin	AMOXICILLIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500mg	Remedica Ltd.	Kipar	117.80	1g	14.73	50.00		
1021007	J01CA04	amoksicilin	OSPAMOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	252.30	1 g	18.02	50.00		
3021001	J01CA04	amoksicilin	OSPAMOX	prašak za oralnu suspenziju	1 po 60 ml (500 mg/5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	129.60	1 g	21.60	50.00		
3021147	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN baby	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml; (250mg/5ml)	Galenika a.d	Republika Srbija	130.50	1g	26.10	50.00		
3021602	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	240.00	1 g	96.00	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021606	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	454.00	1 g	90.80	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021608	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	286.40	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021609	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	572.80	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021568	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	286.40	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021637	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70ml (400mg+57mg)/5ml	SmithKline Beecham Pharmaceutical	Velika Britanija	286.40	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1021611	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	522.40	1g	69.65	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021610	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	250.10	1g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021563	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	film tableta	strip, 14 po 875mg+125mg	PHARMAS D.O.O.	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
3021569	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	prašak za oralnu suspenziju	boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	286.40	1g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021570	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	prašak za oralnu suspenziju	boca plastična, 1 po 100ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	409.10	1g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	325.30	1 g	86.75	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	696.50	1 g	69.65	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	350.10	1 g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	348.30	1 g	69.66	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	250.10	1 g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	522.40	1 g	69.65	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	Glaxo Wellcome Production; Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.	Francuska; Poljska	434.50	1 g	35.47	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021561	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blister,14 po (500mg+125mg)	Belupo,ljekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	487.60	1g	69.66	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021562	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blister,14 po (875mg+125mg)	Belupo,ljekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
3321875	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	166.10	2 g	66.44	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321870	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister. 16 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	144.60	2 g	72.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1321872	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister. 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	218.50	2 g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1321711	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	kapsula, tvrda	blister. 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	218.50	2 g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1321010	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	kapsula, tvrda	blister. 16 po 500 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	218.50	2g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
3321012	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	166.10	2g	66.44	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321124	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister. 16 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	218.50	2g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta
3321904	J01DB05	cefadroksil	VALDOCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)	Alkaloid AD Skoplje	Republika Makedonija	242.60	2g	97.04	50.00	1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03). 2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30). 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta
1321900	J01DB05	cefadroksil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister. 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skoplje	Republika Makedonija	388.00	2g	97.00	50.00	1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03). 2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30). 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	Samo za decu.
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister. 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	325.60	0,5 g	65.12	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister. 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	412.70	0,5 g	41.27	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tableta	blister. 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	642.10	0,5 g	45.86	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tableta	blister. 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.	Turska	412.70	0,5 g	41.27	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
3321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	644.50	0.5 g	184.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66), 5. Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3321957	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	972.10	0.5 g	138.87	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66), 5.Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321195	J01DC04	cefahlor	ALFACET	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	776.40	1 g	97.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu
3321193	J01DC04	cefahlor	ALFACET	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (25mg/ml)	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	171.20	1 g	114.13	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta
3321194	J01DC04	cefahlor	ALFACET	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (50mg/ml)	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	315.90	1 g	105.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
3321951	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)	Facta Farmaceutici S.P.A.	Italija	828.00	1 g	276.00	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GMBH	Nemačka	1,288.50	1 g	257.70	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu
3321621	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	698.00	0,4 g	139.60	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34)	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
3321623	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d Skopje	Republika Makedonija	418.80	0,4 g	139.60	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	515.60	0,4 g	51.56	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	257.80	0,4 g	51.56	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
3321525	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	prašak za oralnu suspenziju	bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	344.70	0,4 g	172.35	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1321521	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	315.40	0,4 g	126.16	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
1321523	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	631.00	0,4 g	126.20	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
3026210	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	sirup	bočica, 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	154.40	1,92 g	61.76	50.00		
1026211	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	tableta	blister, 20 po (400 mg + 80 mg)	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	173.20	1,92 g	34.64	50.00		
1026131	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	tableta	blister, 20 po (400 mg +80 mg)	Bosnalijek DD	Bosna i Hercegovina	150.40	1.92g	30.08	50.00		
1325152	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	film tableta	blister, 20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	240.20	1 g	48.04	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325153	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	tableta	20 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	396.70	1 g	39.67	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325095	J01FA03	midekamicin	MACROPEN	film tableta	blister, 16 po 400 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	256.50	1 g	40.08	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1: A48.2), 4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3325096	J01FA03	midekamicin	MACROPEN	granule za oralnu suspenziju	bočica,115 ml po 175 mg/5 ml	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	417.00	1 g	103.60	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1: A48.2), 4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	412.00	0,3 g	82.40	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	Samo za decu.
2325625	J01FA09	klaritromicin	KLACID	granule za oralnu suspenziju	boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	313.50	0,5 g	104.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65: H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	355.70	0,5 g	25.41	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	197.50	0,5 g	28.21	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	395.00	0,5 g	28.21	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	355.70	0,5 g	25.41	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	197.50	0,5 g	28.21	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
3325483	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	133.90	0,3 g	100.43	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65: H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja
3325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	240.30	0,3 g	60.08	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65: H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	202.50	0,3 g	40.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65: H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	189.40	0,3 g	37.88	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65: H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	202.50	0,3 g	40.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65: H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	189.40	0,3 g	37.88	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	189.40	0,3 g	37.88	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325572	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Special Product's Line S.P.A.	Italija	189.40	0,3 g	37.88	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister. 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	257.30	1,2 g	85.77	50.00		Samo za decu.
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister. 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	482.00	1,2 g	80.33	50.00		Samo za decu.
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister. 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,205.00	1,2 g	80.33	50.00		Samo za decu.
1329192	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROCINAL	film tableta	blister. 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329411	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	film tableta	blister. 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329400	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister. 10 po 250 mg	Alkaloid d o o Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	167.80	1 g	67.12	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329401	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister. 10 po 500 mg	Alkaloid d o o Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329511	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister. 10 po 250 mg	Remedica Ltd	Kipar	167.80	1 g	67.12	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329510	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister. 10 po 500 mg	Remedica Ltd	Kipar	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3 Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329200	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister 10 po 250 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	167.80	1g	67.12	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329201	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister 10 po 500 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	304.20	1g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1132350	J01MA06	norfloksacin	URICIN	film tableta	blister. 20 po 400 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	420.40	0,8 g	42.04	50.00		
1132181	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	film tableta	blister, 20 po 400mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	420.40	800 mg	42.04	50.00		
1025859	J04AB02	rifampicin	RIFAMOR	kapsula, tvrda	blister. 16 po 300 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	391.10	0,6 g	48.89	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328230	J05AB01	aciklovir	ACIKLOVIR	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	794.50	4 g	635.60	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328621	J05AR10	lopinavir, ritonavir	ALUVIA	film tableta	boca, 1po 120 (200 mg + 50 mg)	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	7,797.40	-	-	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328622	J05AR10	lopinavir, ritonavir	ALUVIA	film tableta	bočica plastična, 1 po 60 (100 mg + 25 mg)	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	3,928.40	-	-	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328617	J05AE03	ritonavir	NORVIR	film tableta	boca, 30 po 100 mg	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	2,402.30	1,2 g	960.92	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328120	J05AE07	fosamprenavir	TELZIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 700 mg	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	34,292.50	1,4 g	1,143.08	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328612	J05AE10	darunavir	PREZISTA	film tableta	boca, 60 po 600 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	68,995.20	1,2 g	2299.84	50.00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328411	J05AF01	zidovudin	ZIDOSAN	kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	8,270.20	0,6 g	496.21	50.00	HIV infekcija (B20, B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328376	J05AF05	lamivudin	ZEFFIX	film tableta	28 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	5,982.10	0,3 g	638.80	50.00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1),hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg^{-} : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
1328375	J05AF05	lamivudin	EPIVIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 150 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	7,569.70	0,3 g	252.32	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328530	J05AF06	abakavir	ZIAGEN	film tableta	blister, 60 po 300 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	24,898.60	0,6 g	829.95	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328500	J05AF07	tenofovir	VIREAD	film tableta	boca, 30 po 245 mg	Gilead Sciences Ltd.	Irska	14,771.50	0,245 g	492.38	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2. B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22. B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328501	J05AF07	tenofovir	GILESTRA	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Remedica LTD	Kipar	14,771.50	0.245g	492.38	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2. B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22. B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328540	J05AF07	tenofovir	TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Mylan Hungary KFT.; Mcdermott Laboratoires Ltd T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin	Mađarska; Irska	14,771.50	0,245 g	492.38	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2. B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328380	J05AG01	nevirapin	VIRAMUNE	tableta	blister. 60 po 200 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3,686.50	0,4 g	122.88	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328393	J05AG03	efavirenz	STOCRIN	film tableta	bočica plastična, 30 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	11,844.60	600 mg	394.82	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328640	J05AR01	zidovudin, lamivudin	COMBIVIR	film tableta	blister, 60 po (300 mg + 150 mg)	Glaxo Operations UK Limited; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A	Velika Britanija; Poljska;	15,478.70	2 tablete	515.96	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328601	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	22,932.30	1 tableta	764.41	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328609	J05AR02	lamivudin, abakavir	AMALIBRA	film tableta	blister, 30 po (300mg + 600mg)	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	12,742.00	1 tableta	424.73	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3 Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328442	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TRUVADA	film tableta	boca, 30 po (245mg+200mg)	Gilead Sciences Ltd.	Irska	24,953.50	1 tableta	831.78	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolsti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328502	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg+200mg)	Remedica LTD	Kipar	14,842.70	1 tableta	494.76	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolsti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328503	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TENOFOVIRDIZOPROKSIL/EMTRICITABIN KRKA	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg + 200 mg)	Krka d.d., Novo Mesto; Tad pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	14,842.70	1 tableta	494.76	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolsti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328443	J05AR08	emtricitabin, tenofovir, rilpivirin	EVIPLERA	film tableta	boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	47,190.00	1 tableta	1,573.00	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolsti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328666	J05AR13	lamivudin, abakavir, dolutegravir	TRIUMEQ	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)	Glaxo Wellcome S.A	Španija	54,996.90	1 tableta	1,833.23	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328613	J05AR14	darunavir, kobicistat	REZOLSTA	film tableta	bočica plastična, 30 po (800mg+150mg)	Janssen-Cilag S.P.A	Italija	39,097.00	1 tableta	1,303.23	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328660	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	bočica, 60 po 400 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	32,062.90	0,8 g	1,068.76	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328661	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	boca plastična, 60 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	32,062.90	0.8 g	712.51	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328657	J05AX09	maravirok	CELSENTRI	film tableta	blister. 60 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	76,085.30	0,6 g	5,072.35	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328656	J05AX09	maravirok	CELSENTRI	film tableta	blister. 60 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	76,085.30	0,6 g	2,536.18	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328659	J05AX12	dolutegravir	TIVICAY	film tableta	bočica plastična, 30 po 50 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	83,120.30	50mg	2,104.01	50.00	HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23, B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolsti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1030222	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.50	kapsula	blister, 20 po 50 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	10,037.00	-	-	50.00		
1039285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR ◊	kapsula, tvrda	boca, 100 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A	Italija	2,053.40	-	-	50.00	Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetska dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, KC Kragujevac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.
1031043	L01XX11	estramustin	ESTRACYT ◊	kapsula	100 po 140 mg	Pfizer Italia S.R.L	Italija	12,351.70	-	-	50.00	Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0. 1 ili 2.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za urologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za urologiju KC Vojvodine, Klinika za onkologiju KC Niš, KC Kragujevac.
3048912	L02AB01	megestrol	MEGACE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	Andersonbrecon (UK) Ltd.; PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana	Velika Britanija; Slovenija	5,947.10	160 mg	99.12	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi. očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1048913	L02AB01	megestrol	MEGACE	tableta	bočica, 30 po 160 mg	Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss d o o	Nemačka; Slovenija	4,618.10	160 mg	153.94	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi. očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048915	L02AB01	megestrol	MEGOXI	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,947.10	160 mg	99.12	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi. očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1039395	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN	tableta	strip, 30 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	217.20	20 mg	14.48	50.00		
1039001	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	217.20	20 mg	14.48	50.00		
1039000	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	462.60	20 mg	15.42	50.00		
1037076	L02BB03	bikalutamid	BICADEX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2,008.70	50 mg	71.74	50.00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hirurišku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1037300	L02BB03	bikalutamid	BELANTIS	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	2,152.20	50 mg	71.74	50.00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hirurišku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1039326	L02BG03	anastrozol	TRASOLETTE	film tableta	blister, 28 po 1 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,367.10	1 mg	48.83	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica. PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039720	L02BG03	anastrozol	AREMED	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Remedica Ltd	Kipar	1,367.10	1 mg	48.83	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica. PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,096.60	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica. PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039333	L02BG04	letrozol	LETROZOLE PHARMASWISS	film tableta	blister, 28 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,023.50	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica. PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039002	L02BG04	letrozol	LORTANDA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,096.60	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica. PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039332	L02BG04	letrozol	LETROZOL SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Salutas Pharma Gmbh	Nemačka	1,096.60	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039390	L02BG06	eksemestan	AROMASIN	tableta	30 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1,627.50	25 mg	54.25	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039377	L02BG06	eksemestan	EXEDRAL 25	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1,627.50	25 mg	54.25	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039405	L02BG06	eksemestan	ESCEPRAN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,627.50	25 mg	54.25	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014083	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	film tableta	blister, 150 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12,042.70	2 g	321.14	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014260	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 180 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	13,474.10	2 g	898.27	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014261	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 360 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	26,929.20	2 g	897.64	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014081	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	kapsula	blister, 300 po 250 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	8,468.10	2 g	225.82	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014270	L04AA10	sirolimus	RAPAMUNE	obložena tableta	blister, 30 po 1 mg	Wyeth Pharmaceuticals; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Velika Britanija; Irska	11,971.40	3 mg	1,197.14	50.00	Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014051	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	10,267.60	1,5 mg	1,026.76	50.00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014052	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	19,501.80	1,5 mg	975.09	50.00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014990	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	2,686.70	0,25 g	537.34	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014992	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	5,149.90	0,25 g	514.99	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014991	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	10,029.40	0,25 g	501.47	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014999	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Novartis Pharma GMBH	Nemačka	13,222.30	0,25 g	661.12	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014904	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	1,901.50	0,25 g	380.30	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014908	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	3,687.80	0,25 g	368.78	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014913	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	6,902.20	0,25 g	345.11	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014900	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	9,255.90	0,25 g	462.80	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014250	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	60 po 1 mg	Astellas	Irska	6,264.00	5 mg	523.67	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014251	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 5 mg	Astellas	Irska	14,565.80	5 mg	485.53	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014252	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 0,5 mg	Astellas	Irska	1,714.90	5 mg	571.63	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014240	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	2,449.70	5 mg	816.57	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014242	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 1 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	4,488.60	5 mg	748.10	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014245	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 3 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	14,206.60	5 mg	789.26	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014247	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	20,808.40	5 mg	693.61	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014020	L04AX01	azatioprin	IMURAN	film tableta	100 po 50 mg	Excella GmbH & CO.KG	Nemačka	2,030.30	0,15 g	60.91	50.00		
1034330	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG KG	Austrija	746.80	2,5 mg	14.94	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1034331	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG KG	Austrija	1,331.20	2,5 mg	13.31	50.00		
3162033	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	sirup	plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	147.50	1,2 g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162325	M01AE01	ibuprofen	IBALGIN BABY	oralna suspenzija	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Zentiva K.S.	Češka	147.50	1,2 g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162519	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	147.50	1,2g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162001	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX® ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skoplje	Makedonija	147.50	1,2g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162101	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 60 ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	88.50	1,2 g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162089	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	oralna suspenzija	boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)	Farmasierra Manufacturing S.L.; Famar Nederland B.V.; Farmalider S.A.	Španija, Holandija, Španija	380.90	1,2 g	76.18	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162328	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN JUNIOR NARANDŽA	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	177.70	1,2 g	53.31	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162329	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX RP	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (40 mg/ml)	Hemoform a.d. Vršac	Republika Srbija	177.70	1.2 g	53.31	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1165122	M03BX02	tizanidin	SIRDALUD	tableta	blister, 30 po 4 mg	Novartis Urunleri	Turska	355.80	12 mg	35.58	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1165121	M03BX02	tizanidin	TIZAX	tablete	blister, 30 po 4 mg	PharmaS d.o.o	Republika Srbija	355.80	12 mg	35.58	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1168089	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL	tableta	blister. 40 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	103.20	0,4 g	10.32	50.00		
1168051	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BELUPO	tableta	bočica staklena, 100 po 100 mg	Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	258.00	0,4 g	10.32	50.00		
1168052	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BELUPO	tableta	blister. 50 po 200 mg	Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	246.00	0,4 g	9.84	50.00		
3087302	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A	Italija	1,236.70	0,1 g	618.35	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem	
3087303	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	1,236.70	0,1 g	206.12	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3087301	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A	Italija	558.20	0,1 g	139.55	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem	
3087304	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	sirup	boca staklena,1 po 100 ml (10 mg/5ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	330.50	0,1 g	165.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087711	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 8 mg	Janssen Pharmaceutica N.V., Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	2,733.30	20 mg	488.09	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087710	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 16 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	4,817.20	20 mg	430.11	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087715	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 32 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	16,948.40	20 mg	378.31	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087448	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 5mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Bugarska; Island	389.40	75 mg	194.70	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087449	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister. 30 po 10mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Bugarska; Island	594.60	75 mg	148.65	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087450	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister. 30 po 20mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Bugarska; Island	976.20	75 mg	122.28	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1087551	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 5 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	389.40	75 mg	194.70	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087552	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 10 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	594.60	75 mg	148.65	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem	
1087251	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	978.20	75 mg	122.28	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087252	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 40 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	2,249.80	75 mg	140.61	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087253	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	3,789.00	75 mg	118.41	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087660	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (5mg+2.5mg)	Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	917.40	75 mg	458.70	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem	
1087662	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (10mg+5mg)	Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	1,617.40	75 mg	404.35	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087664	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (20mg+10mg)	Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	2,844.50	75 mg	355.56	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087666	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (40mg+20mg)	Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	5,326.10	75 mg	332.88	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	727.50	1,2 mg	41.57	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1,455.00	1,2 mg	41.57	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2,468.50	1,2 mg	47.02	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2,438.20	1,2 mg	34.83	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm^2)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	727.50	1,2 mg	42.33	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm^2)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	1,455.00	1,2 mg	42.33	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm^2)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2,468.50	1,2 mg	47.87	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2,438.20	1,2 mg	35.46	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
1087530	N02AX02	tramadol	TRODON	kapsula, tvrda	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	183.20	0,3 g	54.96	50.00		
1087650	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	326.90	0,3 g	49.04	50.00		
1087651	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 150 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	469.70	0,3 g	46.97	50.00		
1087553	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	163.50	0,3 g	49.05	50.00		
3086695	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL	sirup	boca staklena, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	127.80	3 g	159.75	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3086742	N02BE01	paracetamol	PANATERM	sirup	bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)	Sopharma AD	Bugarska	159.70	3 g	159.70	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084210	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75.60	0,1 g	16.80	50.00		
1084521	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	168.40	0,1 g	5.61	50.00		
3084513	N03AD01	etosuksimid	SUXINUTIN	sirup	bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)	Famar Orleans	Francuska	379.90	1,25 g	47.49	50.00	1. Epilepsija (G40-G41).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1084402	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	116.00	8 mg	15.47	50.00		
1084255	N03AE01	klonazepam	KLONAZEPAM REMEDICA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Remedica Ltd.	Kipar	99.80	8 mg	13.31	50.00		
1084070	N03AF01	karbamazepin	GALEPSIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	260.70	1 g	26.07	50.00		
1084060	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	260.70	1 g	26.07	50.00		
3084532	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 250 ml (100 mg/5 ml)	Novartis Pharma GmbH	Nemačka	414.00	1 g	82.80	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084530	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A.	Švajcarska; Italija	484.10	1 g	40.34	50.00		
1084351	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE-RETARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd	Kipar	337.60	1 g	28.13	50.00		
3084501	N03AG01	natrijum valproat	EFTIL	sirup	bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Unither Liquid Manufacturing	Republika Srbija; Francuska	400.70	1,5 g	80.14	50.00		
1084500	N03AG01	natrijum valproat, valproinska kiselina	EFTIL	tableta sa produženim oslobađanjem	fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie	Republika Srbija; Francuska	342.90	1,5 g	35.87	50.00		
1084817	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	VALPROIX	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (145 mg + 333 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	342.90	1,5 g	35.87	50.00		
1084550	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	144.00	0,3 g	57.60	50.00	1 Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084551	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	307.70	0,3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084552	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	567.40	0,3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084827	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	144.00	0,3 g	57.60	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084826	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	307.70	0,3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084825	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	567.40	0,3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084080	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	144.00	0,3 g	57.60	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084081	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	307.70	0,3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084082	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	567.40	0,3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084083	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 200 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	1,421.90	0,3 g	71.10	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084230	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 25 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	144.00	0.3 g	57.60	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084231	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 50 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	307.70	0.3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084232	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 100 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	567.40	0.3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084233	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 200 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	1,421.90	0.3 g	71.10	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084700	N03AX11	topiramat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	277.90	0,3 g	119.10	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084701	N03AX11	topiramat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	644.50	0,3 g	138.11	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084702	N03AX11	topiramat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	1,143.40	0,3 g	122.51	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	768.60	1,8 g	92.23	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	768.60	1,8 g	92.23	50.00	Epilepsija (G40-G41).	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3084823	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)	Nextpharma SAS	Francuska	3,357.80	1,5 g	167.89	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
1084832	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,245.50	1,5 g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084833	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2,408.30	1,5 g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084516	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 750 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	2,627.10	1,5 g	87.57	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084518	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	680.60	1,5g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084517	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	1,245.50	1,5g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084519	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	2,408.30	1,5g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084818	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	680.60	1,5g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084819	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister. 60 po 500 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	1,245.50	1,5g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
1084824	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	2,408.30	1,5g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084801	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister. 60 po 250 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	680.60	1,5 g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084800	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister. 60 po 500 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	1,245.50	1,5 g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084802	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	2,408.30	1,5 g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084830	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 250	film tableta	blister. 60 po 250 mg	Remedica Ltd ; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar, Grčka	680.60	1,5 g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084841	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 500	film tableta	blister. 60 po 500 mg	Remedica Ltd ; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar, Grčka	1,245.50	1,5 g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084842	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 1000	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Remedica Ltd ; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar, Grčka	2,408.30	1,5 g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084015	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM SANDOZ	film tableta	blister. 60 po 250 mg	S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmaceutska družba d.d	Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija	680.60	1,5 g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
1084014	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM SANDOZ	film tableta	blister. 60 po 500 mg	S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmaceutska družba d.d.	Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija	1,245.50	1,5 g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084013	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM SANDOZ	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmaceutska družba d.d.	Rumunija, Poljska, Nemačka; Slovenija	2,408.30	1,5 g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	368.90	0,3 g	79.05	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1,441.20	0,3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,468.50	0,3 g	44.08	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75 mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	971.80	0,3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister. 60 po 150 mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1,544.20	0,3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister. 90 po 50mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2,002.90	0,3 g	133.53	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister. 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,246.20	0,3 g	133.52	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084108	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister. 56 po 75mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084131	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister. 56 po 100 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,584.60	0,3 g	84.89	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister. 56 po 150 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,441.20	0,3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister. 56 po 300 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2,468.50	0,3 g	44.08	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084144	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan B.V.; Mcdermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija; Irska; Mađarska	907.00	0.3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084145	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan B.V.; Mcdermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija; Irska; Mađarska	1,441.20	0.3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1085320	N04AA02	biperiden	MENDILEX	tableta	blister, 50 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	158.80	10 mg	15.88	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.
1085212	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	tableta	boca staklena,100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	2,263.70	0,6 g	67.91	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085307	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR ROCHE	tableta	bočica,100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2,263.70	0,6 g	67.91	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085302	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR HBS	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	bočica, 30 po (100 mg + 25 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	351.70	0,6 g	70.34	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085350	N04BB01	amantadin sulfat	PK MERZ	tableta	30 po 100 mg	Merz Pharma GmbH	Nemačka	464.50	0,2 g	30.97	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1149040	N04BC01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	409.80	40 mg	218.56	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa
1070056	N05AA01	hlorpromazin	HLORPROMAZIN	film tableta	blister, 50 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	104.10	300 mg	24.98	50.00		
1070850	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	107.90	10 mg	43.16	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070851	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	370.90	10 mg	29.67	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070254	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica. 25 po 1mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	107.90	10 mg	43.16	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070256	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica, 100 po 2.5mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,054.70	10 mg	42.19	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070841	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	446.30	8 mg	11.90	50.00		
1070840	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	plastična bočica, 25 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	219.90	8 mg	35.18	50.00		
1070800	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	blister, 25 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	219.90	8 mg	35.18	50.00		
1070801	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	446.30	8 mg	11.90	50.00		
1070202	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	bočica staklena, 25 po 2 mg	Krka d.d.	Slovenija	219.90	8 mg	35.18	50.00		
1070205	N05AD01	haloperidol	HALDOL	tableta	bočica staklena, 30 po 10 mg	Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija	Slovenija	446.30	8 mg	11.90	50.00		
1070018	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	907.80	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070017	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,808.90	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070025	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	847.30	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070023	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	1,686.40	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070015	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d	Poljska, Slovenija	847.30	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070016	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d.	Poljska, Slovenija	1,686.40	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070093	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	907.80	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070092	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	1,806.90	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070005	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	2,542.30	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070008	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	3,389.90	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070979	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	686.40	10 mg	49.03	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070975	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	1,372.90	10 mg	49.03	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070976	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	2,542.30	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070977	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	3,389.90	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070920	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	152.60	5 mg	38.15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070921	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	274.60	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070922	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	457.70	5 mg	38.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070923	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	678.00	5 mg	42.38	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070034	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	152.60	5 mg	38.15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070035	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	274.60	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070036	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	457.70	5 mg	38.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070037	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	678.00	5 mg	42.38	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070063	N05AX08	risperidon	TORENDO	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	274.60	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070065	N05AX08	risperidon	TORENDO	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	457.70	5 mg	38.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070935	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	152.60	5 mg	38.15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070928	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	274.60	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070929	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	457.70	5 mg	38.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070670	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	274.60	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena,100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1,462.40	5 mg	73.12	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9). 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79), 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1), 6. Poremećaji ponašanja (F91).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6 samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza" posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070666	N05AX08	risperidon	RISPERIDON ADOC	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Island; Bugarska	152.60	5 mg	38.15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070080	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	457.70	5 mg	38.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070081	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	823.80	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070082	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	1,373.10	5 mg	38.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070101	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	1,084.10	15mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra"
1070103	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	1,626.20	15mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra"
1070165	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRIX	tableta	30 po 15 mg	Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija, Rumunija	1,626.20	15mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra"
1070044	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	542.10	15mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra"
1070045	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	1,084.10	15mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra"
1070046	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	1,626.20	15mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra"
1070130	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	542.10	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070132	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	1,084.10	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070134	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 15 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	1,626.20	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070136	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 30 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	3,252.40	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070170	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1,084.10	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070171	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 15 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	1,626.20	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070172	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	3,252.40	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
N002592	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	rastvor za rektalnu primenu	5 po 5 mg/2,5 ml	Apoteka-galenska laboratorija	Republika Srbija	481.90	10 mg	192.76	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071121	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	92.80	10 mg	6.19	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071122	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	139.10	10 mg	4.64	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071701	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	92.80	10 mg	6.19	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071702	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	139.10	10 mg	4.64	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071171	N05BA01	diazepam	APAURIN	obložena tableta	blister, 30 po 2 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	67.80	10 mg	11.30	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071172	N05BA01	diazepam	APAURIN	obložena tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	92.80	10 mg	6.19	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071175	N05BA01	diazepam	APAURIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	139.10	10 mg	4.64	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1072762	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE	film tableta	blister. 100 po 10 mg	Remedica Ltd.	Kipar	210.40	75 mg	15.78	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072763	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	97.70	75 mg	9.77	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072730	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	170.50	0,1 g	22.73	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072731	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	336.60	0,1 g	22.44	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072700	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	kapsula, tvrda	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	342.30	20 mg	11.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072930	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	342.30	20 mg	11.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072920	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	film tablete	blister. 20 po 20mg	Bosnaljek D.D.	Bosna i Hercegovina	228.20	20mg	11.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42). 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072062	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	126.80	20 mg	12.68	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072061	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	198.40	20 mg	9.92	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072067	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	317.00	20 mg	12.68	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072060	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	496.20	20 mg	9.92	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072914	N06AB05	paroksetin	ARKETIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V	Holandija	194.30	20mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072790	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg	Italija; Nemačka	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072791	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg	Italija; Nemačka	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072724	N06AB06	sertralin	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072723	N06AB06	sertralin	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072644	N06AB06	sertralin	TRAGAL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072643	N06AB06	sertralin	TRAGAL	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072635	N06AB06	sertralin	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072636	N06AB06	sertralin	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072627	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tablete	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	159.90	10 mg	11.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072625	N06AB10	escitalopram	LATA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	181.30	10 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42)	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072628	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	181.30	10mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072000	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d o o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	171.30	10 mg	11.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072001	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d o o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	194.30	10 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4 Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072003	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o Beograd	Republika Srbija	616.90	10 mg	10.28	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072624	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	194.30	10 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072626	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	616.90	10 mg	10.28	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072007	N06AB10	escitalopram	ELICEA Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Genepharm SA; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Grčka; Slovenija	575.80	10mg	10.28	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1073190	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 18 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3,460.30	30 mg	192.24	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajović" - Beograd, 4. Klinički centar Vojvodine, 5. Klinički centar Niš, 6 Klinički centar Kragujevac.
1073191	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 36 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	4,108.10	30 mg	114.11	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova. 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajović" - Beograd, 4. Klinički centar Vojvodine, 5. Klinički centar Niš, 6. Klinički centar Kragujevac.
1088055	N07AA02	piridostigmin	MESTINON	obložena tableta	bočica staklena, 150 po 60 mg	ICN Polfa Rzeszow S A	Poljska	2,609.80	0,18 g	52.20	50.00		
1075091	N07BB01	disulfiram	ESPERAL	tableta	tuba, 20 po 500 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.; Sanofi Aventis ZRT	Portugalija; Madarska	161.10	0,2 g	3.22	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2087310	N07BC02	metadon	METADON	kapi	bočica. 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153.70	25 mg	38.43	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
2087505	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica. 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	153.70	25 mg	38.43	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087515	N07BC02	metadon	METADON MOLTENI	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	141.30	25 mg	35.33	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087508	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica, 1 po 6 ml (10mg/ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	92.20	25 mg	38.42	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1029080	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	tableta	blister. 20 po 250 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	132.10	2 g	52.84	50.00	1 Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiaza (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29) 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	
1029082	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	221.70	2 g	55.43	50.00	1. Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiaza (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29) 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	
1029083	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL D	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	221.70	2 g	55.43	50.00	1 Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05).	
3028300	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	oralna suspenzija	bočica.1 po 30 ml (100 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	158.50	0,2 g	52.83	50.00		
7110311	R01AD09	mometazon	NASONEX	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (0,05%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	722.30	200 mcg	20.64	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110313	R01AD09	mometazon	MOMENSA	sprej za nos, suspenzija	bočica, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	Alvogen Pharma d.o.o.; Farmea	Republika Srbija, Francuska	438.60	200 mcg	12.53	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110024	R01AD09	mometazon	MOMETAZON SANDOZ	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje 1 po 120 doza (50mcg/doza)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	375.90	200 mcg	12.53	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110033	R01AD12	flutikazonfuroat	AVAMYS	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27,5 mcg/doza)	Glaxo Operations UK Limited; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	627.60	110 mcg	20.93	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije
7114462	R03AC02	salbutamol	SPALMOTIL	rastvor za raspršivanje	boca staklena,1 po 10 ml (5 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	209.60	10 mg	41.92	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114550	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po 100mcg/doza	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Production	Poljska; Francuska	306.00	0,8 mg	12.24	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1,832.40	100 mcg	61.08	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,119.40	24 mcg	74.63	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,754.30	24 mcg	58.48	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114725	R03AK03	fenoterol. ipratropijum bromid	BERODUAL N	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom,1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	767.40	6 inh.	23.02	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114129	R03AL01	fenoterol. ipratropijum bromid	BERODUAL	rastvor za raspršivanje	bočica od tamnog stakla,1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)	Istituto De Angeli S.R.L.	Italija	409.80	-	-	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	1,898.60	2 inh.	63.29	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2,363.10	2 inh.	78.77	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus. 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	3,109.70	2 inh	103.66	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2,014.10	2 inh	67.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2,650.30	2 inh	88.34	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114677	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALMETEROL/ FLUTIKAZONPROPIONAT	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom. 1 po 120 doza (25mcg/doza+125mcg/doza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	2,014.10	4 inh.	67.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114678	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALMETEROL/ FLUTIKAZONPROPIONAT	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom. 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/doza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	2,650.30	4 inh.	88.34	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,598.40	4 inh.	106.56	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114711	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,597.30	4 inh.	106.49	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114610	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2,922.80	4inh	97.43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2,884.10	2 inh.	95.47	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114714	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z O.O; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,922.80	4 inh.	97.43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114713	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP Z O.O; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,884.10	2 inh.	95.47	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,719.00	1 doza	90.63	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,511.10	1 doza	117.04	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114150	R03AL02	salbutamol, ipratropijum-bromid	SALBUTAMOL/IPRATROPIJUM BROMID	rastvor za raspršivanje	ampula, 60 po 2,5 ml (2.5mg/2,5ml + 0,5mg/2,5ml)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	1,229.50	3 inh.	61.48	50.00	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114562	R03BA01	beklometazon	BECLOFORTE CFC-FREE INHALER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	777.00	800 mcg	12.43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	689.90	800 mcg	27.60	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,971.20	800 mcg	39.42	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114576	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1,199.30	800 mcg	95.94	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114577	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1,588.40	800 mcg	63.54	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114597	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španija	779.10	0,6 mg	77.91	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	773.20	0,6 mg	61.86	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1,404.50	0,6 mg	56.18	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom,1 po 5 ml (60 doza po 160 mcg)	Takeda GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	1,854.60	0.16 mg	30.91	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu starija od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Takeda GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	2,580.80	0.16 mg	43.01	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu starija od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
3114460	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	oralni rastvor	boca,1 po 200 ml (2 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	211.10	12 mg	31.67	50.00		
1114461	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	128.00	12 mg	12.80	50.00		
1114220	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 125 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	140.60	0,4 g	11.25	50.00		
1114221	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	341.60	0,4 g	13.66	50.00		
1114503	R03DA05	aminofilin	AMINOFILIN Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	220.30	0,6 g	18.88	50.00		
1114293	R03DA05	aminofilin	AMINOFILIN RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	330.40	0,6 g	18.88	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1114640	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	741.30	10 mg	52.95	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	679.50	10 mg	24.27	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
3114644	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	granule	kesica, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1,246.30	10 mg	111.28	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114646	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1,085.00	10 mg	96.88	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114552	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	1,085.00	10 mg	96.88	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114553	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	741.30	10 mg	52.95	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	679.50	10 mg	24.27	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	679.50	10 mg	24.27	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
7112250	R05CB13	dornaza alfa	PULMOZYME	rastvor za raspršivanje	6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12,362.30	2,5 mg	2,060.38	50.00	Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).	Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.
3058053	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN	sirup	boca staklena, 5mg/5ml, 200ml	Slavlamed d.o.o	Republika Srbija	378.10	10mg	18.91	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058050	R06AE07	cetirizin	CETIRIZINE ALVOGEN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	190.70	10mg	9.54	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058052	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Slavlamed d.o.o Beograd	Republika Srbija	190.70	10mg	9.54	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058318	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 10 po 5mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	123.40	5mg	12.34	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058317	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 20 po 5mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	246.80	5mg	12.34	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058047	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	film tableta	blister, 30 po 5mg	Aesica Pharmaceuticals S.R.L.	Italija	370.20	5mg	12.34	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2058048	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)	Aesica Pharmaceuticals S.R.L	Italija	491.50	5mg	24.58	50.00	Hronična idiopatska urtikarija (L50).	Samo za decu stariju od 2 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
3058278	R06AX27	desloratadin	AEROGAL	sirup	bočica staklena, 1 po 60 ml (0.5 mg/ml)	Galenika AD	Republika Srbija	262.70	5 mg	43.78	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
4090121	S01AA01	hloramfenikol	CHLORAMPHENICOL	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	131.20	-	-	50.00		
4090816	S01AA01	hloramfenikol	HLORAMFENIKOL ALKALOID	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	131.20	-	-	50.00		
7090801	S01AA11	gentamicin	GENTOKULIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (0,3%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	173.80	-	-	50.00		
4150250	S01AA30	bacitracin, neomicin	ENBECIN	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (500 i.j./g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	137.70	-	-	50.00		
7090010	S01AX13	ciprofloksacin	MAROCEN	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,3%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	205.00	-	-	50.00	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjuktivtis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090620	S01BA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	147.10	-	-	50.00		
7094033	S01EB01	pilokarpin	MIOKARPIN	kapi za oči	bočica, 1 po 10 ml 2%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	153.20	0,4 ml	6.13	50.00		
7096070	S01EC03	dorzolamid	OPTODROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	302.10	0,3 ml	18.13	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096065	S01EC03	dorzolamid	DORZOLAMIDE PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 5ml (20mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	302.10	0,3 ml	18.13	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096060	S01EC04	brinzolamid	AZOPT	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	647.90	0,2 ml	25.92	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093071	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5% (5mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	148.10	0,2 ml	5.92	50.00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093020	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0.5%	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml 0,5%	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	219.90	0,2 ml	4.40	50.00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099172	S01ED51	timolol, latanoprost	VISUS PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	445.70	0,1 ml	17.83	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099005	S01ED51	timolol, latanoprost	LATANOPROST TIMOLOL PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5ml (5mg/ml + 50mcg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	445.70	0,1 ml	17.83	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099173	S01ED51	timolol, latanoprost	LATIMOL	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	445.70	0,1 ml	17.83	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096052	S01ED51	timolol,dorzolamid	OPTODROP-CO	kapi za oči,rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	312.00	0,2 ml	12.48	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099182	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORZOLAMIDE TIMOLOL PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 5ml (5mg/ml + 20mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	312.00	0,2 ml	12.48	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099001	S01EE01	latanoprost	LANOPROGAL	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099141	S01EE01	latanoprost	LATIDROP	kapi za oči,rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 1 po 2,5ml	Rafarm S.A	Grčka	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099142	S01EE01	latanoprost	LATAZ	kapi za oči,rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 3 po 2,5ml	Rafarm S.A	Grčka	1,083.50	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099143	S01EE01	latanoprost	LATAZ	kapi za oči,rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 6 po 2,5ml	Rafarm S.A	Grčka	2,167.00	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099149	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099148	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 3 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	1,083.50	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa
7099002	S01EE01	latanoprost	LATANDROPS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5ml	Vianex S.A-Plant A'	Grčka	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099004	S01EE01	latanoprost	LATANOPROST PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5ml (50mcg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099140	S01EE01	latanoprost	XALATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml 0,005%	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099155	S01EE01	latanoprost	UNILAT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
N002303	V06DX..	bezglutensko brašno	MIX B I MIX C BRAŠNO	prašak	1 kg	Dr.Schär GmbH	Italija	448.00	-	-	50.00	Celijačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do **7 kg** na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003897	V06DX..	bezglutensko brašno	BIOPROCEL I PROCEL	prašak	1 kg	Aroma začini d.o.o. Prehrambena industrija	Republika Srbija	232.70	-	-	50.00	Celijačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do **7 kg** na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003939	V06DX..	bezglutensko brašno	PREMIUM UNIVERZAL MIX	prašak	1 kg	Aleksandrija Fruška gora d.o.o.	Republika Srbija	232.70	-	-	50.00	Celijačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do **7 kg** na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003582	V06DX	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRIDRINK	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1.5 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	181.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004143	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NUTRINIDRINK MF CHOCOLATE	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1.5 kcal/ml)	N.V.Nutricia	Holandija	129.50	-	-	50.00	Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004150	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Banana	emulzija	plastična boca, EasyBottle. 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmBH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004168	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Strawbery	emulzija	plastična boca, EasyBottle. 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmBH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
N004176	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate	emulzija	plastična boca, EasyBottle. 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmBH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004184	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla	emulzija	plastična boca, EasyBottle. 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmBH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
N003590	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRISON	rastvor za enteralnu ishranu	boca, 500 ml (1 kcal/ml)	N.V Nutricia Zoetermeer	Holandija	361.00	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003814	V06DX	hrana za posebne medicinske namene	NEOCATE LCP	prah	limenka, 400 g	SHS International Ltd.	Velika Britanija	4,136.50	-	-	50.00	1. Intolerancija proteina kravljeg mleka 2. Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003954	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE	prah	limenka, 400g	Nutricia Cuijk B.V.	Holandija	1,393.00	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004192	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC ALLERNOVA AR	prah	kartonska kutija, 400 g	UP Industries	Nemačka	1,355.10	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	234.20	20 mg	15.61	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	218.60	20 mg	15.61	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	218.60	20 mg	15.61	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	234.20	20 mg	15.61	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122866	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	110.80	40 mg	15.83	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	133.50	40 mg	9.54	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemačka	110.80	40 mg	15.83	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemačka	221.60	40 mg	15.83	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	133.50	40 mg	9.54	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21)	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.		267.00	40 mg	9.54	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	218.70	30 mg	15.62	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225.90	30 mg	16.14	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	76.20	30 mg	16.33	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122862	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	152.40	30 mg	16.33	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	304.80	30 mg	16.33	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	124.10	30 mg	13.30	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	248.20	30 mg	13.30	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2 lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	496.50	30 mg	13.30	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26. K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
3127425	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	441.90	6,7 g	8.88	15%	1.Portosistemske encefalopatije (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	691.60	1,5 g	207.54	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaje pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 1g	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,234.10	1,5 g	185.12	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaje pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 50 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,948.40	1,5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129477	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 100 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3,896.70	1,5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129478	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 50 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3,896.70	1,5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3129479	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 100 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	7,793.40	1,5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,550.10	1,5 g	93.01	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3,100.20	1,5 g	93.01	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 400 mg	Lek farmaceutska družba d.d. u saradnji sa Tillotts Pharma AG, Švajcarska	Slovenija	2,066.50	1,5 g	77.49	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2,904.70	1,5 g	87.14	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorije	blister, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3,455.40	1,5 g	185.11	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1043005	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. WerK Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	190.70	2 g	12.71	25%		
1043003	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. WerK Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	95.30	2g	12.71	25%		
1043001	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 750 mg	Merck S.L; Merck Sante S.A S, Merck KGaA; Famar Lyon	Španija; Francuska; Nemačka; Francuska	249.60	2g	22.20	60%		
1043000	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S. Merck KGaA; Famar Lyon	Francuska; Nemačka, Francuska	331.00	2 g	22.07	60%		
1042063	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyzne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	370.40	60 mg	12.35	60%		
1042161	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyzne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	740.70	60 mg	12.35	60%		
1042030	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	284.90	60 mg	9.50	50%		
1042028	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	333.60	60 mg	7.42	60%		
1042029	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	667.50	60 mg	7.42	60%		
1042032	A10BB09	gliklazid	GLUKOWIN	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.	Nemačka; Hrvatska	284.90	60 mg	9.50	50%		
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	400.90	30 mg	26.73	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	400.90	30 mg	26.73	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija) -metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	801.80	30 mg	26.73	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	801.80	30 mg	26.73	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija) -metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341365	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta, Republika Srbija	306.10	4 mg	13.60	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.
1341365	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	306.10	4 mg	13.60	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341366	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	583.70	4 mg	12.97	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.
1341366	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	583.70	4 mg	12.97	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1050100	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 50 po 0,25 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	550.40	1 mcg	44.03	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa. a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050102	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 0,5 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	541.30	1 mcg	36.09	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa. a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050101	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 1 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	1,010.10	1 mcg	33.67	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa. a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1,575.60	1 mcg	63.02	25%	Renalna osteodistrofija (N25.0).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
2050087	A11CC05	holekalciferol	VIGANTOL ULJE	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)	Merck KGaA	Nemačka	198.90	20 mcg	0.80	50%		
1063220	B01AA07	acenokumarol	SINKUM 4	tableta	blister, 20 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	107.10	5 mg	6.69	45%		
1063221	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL UNION	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	183.70	5 mg	7.65	45%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068220	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	film tableta	28 po 75 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	494.90	75 mg	17.68	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068502	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Krka- Farma d.o.o.; Krka, Tovarna Zdravil, d.d,	Hrvatska; Slovenija	494.90	75 mg	17.68	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068221	B01AC04	klopidogrel	ANTIAGREX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	494.90	75 mg	17.68	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068239	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	494.90	75 mg	17.68	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068551	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDIX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	494.90	75 mg	17.68	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068030	B01AC04	klopidogrel	CLOPICOR	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Actavis LTD	Malta	494.90	75mg	17.68	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068520	B01AC30	klopidogrel, acetilsalicilna kiselina	DUOPLAVIN	film tableta	blister, 28 po (75 mg + 100 mg)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	1,271.50	1 tableta	45.41	60%	1. Prevencija aterotrombotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta miokarda 2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobađanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.	
1060140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrda	blister, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	330.50	0,2 g	19.16	15%		
1060075	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	tableta za žvakanje	blister, 30 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	368.70	90 mg	11.06	15%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1101422	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 50 mg	Laboratorios Liconsa S.A.	Španija	727.50	0,2 g	48.50	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1101423	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 100 mg	Laboratorios Liconsa S.A.	Španija	1,455.90	0,2 g	48.53	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1101425	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 200 mg	Laboratorios Liconsa S.A.	Španija	2,912.10	0,2 g	48.54	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48) 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
7102621	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerin)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej	boca sa pumpom za doziranje, 14,4 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza)	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	567.30	2,5 mg	17.73	75%		
1109100	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	PharmaS d.o.o.; PharmaS d.o.o.	Republika Srbija; Republika Hrvatska	211.50	40 mg	4.03	55%	Angina pektoris (I20) .	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109142	C01EB15	trimetazidin	MODUXIN MR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	Gedeon Richter Polska SP. Z.Z.O; Gedeon Richter PLC	Poljska; Madjarska	211.50	40 mg	4.03	55%	Angina pektoris (I20) .	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109138	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	S.C. Labormed - Pharma S.A.	Rumunija	211.50	40 mg	4.03	55%	Angina pektoris (I20) .	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109125	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tableta	blister, 56 po 5 mg	Laboratorios Servier S.L. , Les laboratories Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD,	Španija, Francuska, Irska	1,788.50	10 mg	63.88	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti - kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. - u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora. (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenjana interniste ili kardiologa.
1109126	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tableta	blister, 56 po 7,5 mg	Laboratorios Servier S.L. , Les laboratories Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD,	Španija, Francuska, Irska	1,788.50	10 mg	42.58	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti -kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. -u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora. (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenjana interniste ili kardiologa.
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	169.20	2 g	67.68	50%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,2 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	296.60	0,3 mg	16.00	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,4 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	458.00	0,3 mg	12.27	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103090	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.2	film tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	319.90	0,3 mg	16.00	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103092	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.3	film tableta	blister, 30 po 0,3 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	314.20	0,3 mg	10.47	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103093	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.4	film tableta	blister, 30 po 0,4 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	490.70	0,3 mg	12.27	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103892	C02AC06	rilmenidin	TENAXUM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	526.10	1 mg	17.54	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103038	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 2 mg	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	276.00	4 mg	18.40	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103039	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 4 mg	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	467.70	4 mg	15.59	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103046	C03BA11	indapamid	INDAPRES SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	226.60	2,5 mg	12.59	75%		
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	226.60	2,5 mg	12.59	75%		
1103180	C03BA11	indapamid	VAZOPAMID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	226.60	2,5 mg	12.59	75%		
1103444	C03BA11	indapamid	INDAPAMID SR ALKALOID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	226.60	2,5 mg	12.59	75%		
1400476	C03CA04	torasemid	DIUVER	tableta	blister, 20 po 5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	143.20	15mg	21.48	70%		
1400475	C03CA04	torasemid	DIUVER	tableta	blister, 20 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	235.60	15mg	17.69	70%		
1400480	C03DA04	eplerenon	INSPRA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Fareva Amboise	Francuska	1,913.70	50 mg	127.58	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400481	C03DA04	eplerenon	INSPRA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Fareva Amboise	Francuska	2,187.10	50 mg	72.90	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400000	C03EB01	furosemid, spironolakton	FURAS	kapsula	blister, 30 po (20mg + 50mg)	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	582.00	1 tableta	19.40	40%	1. Lečenje rezistentnog edema kada je on povezan sa sekundarnim hiperaldosteronizmom, uključujući i hroničnu srčanu insuficijenciju i cirozu jetre 2.Tretman esencijalne hipertenzije kod pacijenata sa dokazanim hiperaldosteronizmom, ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste: endokrinologa, gastroenterologa ili kardiologa; hirurga ili anesteziologa.
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tableta	blister, 50 po 80 mg	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	456.60	0,16 g	18.26	50%	Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1107810	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 47.5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	138.90	0,15 g	13.89	40%	1. Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107814	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	255.60	0,15 g	12.78	40%	1. Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107633	C07AB12	nebivolol	BINEVOL	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	303.30	5 mg	10.11	35%		
1107634	C07AB12	nebivolol	NEVOTENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.	Republika Srbija; Bugarska; Malta	303.30	5 mg	10.11	35%		
1107666	C07AB12	nebivolol	NEBIGAL	tableta	blister, 28 po 5mg	Galenika AD. U restrukturiranju	Republika Srbija	283.10	5 mg	10.11	35%		
1107632	C07AB12	nebivolol	NEBILET	tableta	blister, 28 po 5 mg	Menarini-Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)	Nemačka; Nemačka	368.00	5 mg	13.14	50%		
1107629	C07AB12	nebivolol	BARIOS	tableta	blister, 30 po 5mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	303.30	5 mg	10.11	35%		
1107638	C07AB12	nebivolol	NEBIVOLOL SANDOZ	tableta	blister, 28 po 5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	283.10	5 mg	10.11	35%		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12.5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	136.60	37,5 mg	13.66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107659	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12.5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	136.60	37.5 mg	13.66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107658	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	republika Srbija	210.60	37.5 mg	10.53	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	127.50	37,5 mg	13.66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	136.60	37,5 mg	13.66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	210.60	37,5 mg	10.53	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107215	C07BB12	nebivolol, hidrohlortiazid	NEBILET PLUS 5/12.5	film tableta	blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)	Menarini - Von Heyden GmbH, Berlin - Chemie AG	Nemačka; Nemačka	400.90	1 tableta	14.32	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1107701	C07BB12	nebivolol, hidrohlortiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5mg+12,5mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	330.40	1 tableta	11.01	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1107702	C07BB12	nebivolol, hidrohlortiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5mg+25mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	355.10	1 tableta	11.84	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402821	C08CA02	felodipin	PLENDIL	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 5 mg	AstraZeneca AB	Švedska	343.40	5 mg	11.45	35%	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402843	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	126.10	10 mg	4.50	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402844	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	201.50	10 mg	3.60	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402784	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	270.20	10 mg	4.50	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402785	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 20 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	431.70	10 mg	3.60	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1104650	C08GA02	amlodipin, indapamid	NATRIXAM	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 5 mg + 1.5 mg	Laboratorios Servier S.L; Ampharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd Les Laboratories Servier Industrie; Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC	Španija; Poljska; Irska; Francuska; Mađarska; Mađarska	419.40	1 tableta	13.98	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1104651	C08GA02	amlodipin, indapamid	NATRIXAM	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 10 mg + 1.5 mg	Laboratorios Servier S.L; Ampharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd Les Laboratories Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC;	Španija; Poljska; Irska; Francuska; Mađarska; Mađarska	482.70	1 tableta	16.09	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 5 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	461.10	4 mg	12.30	45%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsebiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	461.10	4 mg	6.15	40%		
1103955	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103956	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 8 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103856	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103857	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103901	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablete	blister, 30 po 4 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103906	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablete	blister, 30 po 8 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103912	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 4 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103943	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 8 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	199.50	15 mg	14.96	55%		
1103732	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	236.20	15 mg	8.86	25%		
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	187.30	2,5 mg	6.24	65%		
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	463.60	2,5 mg	7.73	65%		
1103666	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko	Hrvatska	144.10	2,5mg	4.80	55%		
1103663	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko	Hrvatska	356.80	2,5mg	5.95	55%		
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	292.60	15 mg	15.68	50%		
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	349.70	15 mg	9.37	50%		
1103825	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tableta	blister, 60 po 10 mg	APL Swift Services (Malta) LTD.	Malta	627.10	15 mg	15.68	50%		
1103826	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tableta	blister, 60 po 20 mg	APL Swift Services (Malta) LTD.	Malta	622.10	15 mg	7.78	45%		
1103940	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 0,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	142.40	2 mg	20.34	60%		
1103941	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 2 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	314.50	2 mg	11.23	60%		
1103942	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	445.70	2 mg	7.96	60%		
1103467	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 30 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	733.30	30 mg	26.19	75%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	156.10	1 tableta	5.20	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	312.10	1 tableta	10.40	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401255	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	505.80	1 tableta	16.86	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401606	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	461.10	1 tableta	15.37	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401607	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI HD	film tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg+2,5mg)	Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratoires Servier Industrie	Poljska, Irska, Francuska	973.40	1 tableta	32.45	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401190	C09BA04	perindopril, indapamid	PERIGARD PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	312.10	1 tableta	10.40	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401030	C09BA06	kvinapril, hidrohlortiazid	HEMOKVIN PLUS	film tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a d	Republika Srbija	237.20	1 tableta	11.86	20%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401400	C09BA08	cilazapril, hidrohlortiazid	PRILAZID PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	564.70	1 tableta	18.82	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401403	C09BA08	cilazapril, hidrohlortiazid	CAZACOMBI	film tableta	blister, 28 po (5 mg+12,5 mg)	Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko	Hrvatska	387.80	1 tableta	13.85	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401236	C09BA09	fosinopril, hidrohlortiazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	476.20	1 tableta	17.01	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103884	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	436.30	1 tableta	14.54	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103455	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM FORTE	tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	579.90	1 tableta	19.33	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103785	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	484.20	1 tableta	16.14	30%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103112	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd., Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	736.70	1 tableta	24.56	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103114	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd., Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	721.20	1 tableta	24.04	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103115	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd., Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	824.40	1 tableta	27.48	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103116	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd., Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	772.40	1 tableta	25.75	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103620	C09BB04	perindopril, amlodipin	VIACORAM	tableta	kontejner za tablete, 30 po (3,5mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	497.60	1 tableta	16.59	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103621	C09BB04	perindopril, amlodipin	VIACORAM	tableta	kontejner za tablete, 30 po (7mg+5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	762.50	1 tableta	25.42	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403021	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN MITE	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	430.70	1 tableta	15.38	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403020	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	476.00	1 tableta	17.00	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403666	C09BB10	trandolapril, verapamil	TARKA	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 28 po (2 mg + 180 mg)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG	Nemačka	1,031.80	1 tableta	36.85	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403667	C09BB10	trandolapril, verapamil	TARKA	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 28 po (4 mg + 240 mg)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG	Nemačka	1,372.60	1 tableta	49.02	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103605	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 5 mg + 0,625 mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	273.10	1 tableta	9.10	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103608	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+5mg+1,25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	476.70	1 tableta	15.89	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103611	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+10mg+1,25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	508.40	1 tableta	16.95	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103614	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+5mg+2,5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	651.50	1 tableta	21.72	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103617	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+10mg+2,5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	714.40	1 tableta	23.81	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103600	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska;Mađarska;Poljska;Irska;Francuska	825.60	1 tableta	27.52	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103602	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska;Mađarska;Poljska;Irska;Francuska	857.50	1 tableta	28.58	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103603	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska;Mađarska;Poljska;Irska;Francuska	1,014.60	1 tableta	33.83	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103604	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska;Mađarska;Poljska;Irska;Francuska	1,059.10	1 tableta	35.30	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103117	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd. Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska, Irska, Poljska; Mađarska	594.30	1 tableta	19.81	40%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom) i/ili stabilne hronične srčane insuficijencije sa smanjenom sistolnom funkcijom leve komore, kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20; I50)	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103118	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irska; Poljska; Mađarska	661.60	1 tableta	22.05	30%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom) i/ili stabilne hronične srčane insuficijencije sa smanjenom sistolnom funkcijom leve komore, kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20; I50)	
1103138	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irska; Poljska; Mađarska	632.70	1 tableta	21.09	40%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom), kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20)	
1103119	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irska; Poljska; Mađarska	694.50	1 tableta	23.15	30%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom), kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20)	
1103150	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	162.80	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103151	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	351.10	50 mg	6.27	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103351	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103350	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	376.20	50 mg	6.27	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103594	C09CA01	losartan	LOSAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103000	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103001	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	376.20	50 mg	6.27	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103792	C09CA01	losartan	LORISTA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	162.80	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103003	C09CA01	losartan	AVELOSARTAN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	185.10	80 mg	6.61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	286.30	80 mg	5.11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103449	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 320 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	605.30	80 mg	5.40	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103782	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	286.30	80 mg	5.11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103784	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	185.10	80 mg	6.61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103030	C09CA03	valsartan	MYOVAL	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	185.10	80 mg	6.61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103029	C09CA03	valsartan	MYOVAL	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	286.30	80 mg	5.11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103771	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Balkanpharma - Dupnitsa a.d., Actavis Ltd	Bugarska; Malta	148.00	80mg	9.87	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1103772	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Balkanpharma - Dupnitsa a.d., Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	198.30	80mg	6.61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103773	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 160 mg	Balkanpharma - Dupnitsa a.d., Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	306.70	80mg	5.11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103401	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	400.90	0,15 g	13.36	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103403	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	505.70	0,15 g	8.43	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blister, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	309.00	40 mg	11.04	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	516.40	40 mg	9.22	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103769	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 80 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	425.60	40 mg	7.09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103509	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 40mg	Zdravlje a.d, Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	254.70	40 mg	8.49	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103510	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 80mg	Zdravlje a.d; Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	425.60	40 mg	7.09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103930	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	237.70	40 mg	8.49	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103931	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	397.20	40 mg	7.09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103932	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 40mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	237.70	40mg	8.49	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103933	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 80mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	397.20	40mg	7.09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401914	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LOSAR PLUS	film tableta	blister, 30 po (50 mg + 12.5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	246.90	1 tableta	8.23	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401120	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LORISTA H	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12.5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	230.50	1 tableta	8.23	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401121	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LORISTA HD	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	402.00	1 tableta	14.36	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103152	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	ERYNORM PLUS	film tableta	blister, 30 po (50mg+12,5mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	246.90	1 tableta	8.23	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401926	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	305.50	1 tableta	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401925	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	324.50	1 tableta	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401924	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (80mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	257.50	1 tableta	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401935	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg+25mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	324.50	1 tableta	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401934	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	305.50	1 tableta	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401933	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (80mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	257.50	1 tableta	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401938	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	MYOVAL PLUS	film tableta	blister, 28 po (80 mg + 12,5mg)	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta, Bugarska;	257.50	1 tableta	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401939	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	MYOVAL PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg + 12,5mg)	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	305.50	1 tableta	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401940	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	MYOVAL PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg + 25mg)	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	324.50	1 tableta	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403111	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tableta	blister, 30 po (80 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska, Malta	275.90	1 tableta	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403112	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska, Malta	327.30	1 tableta	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403113	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 25 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska, Malta	347.70	1 tableta	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401662	C09DA04	irbesartan, hidrohlortiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (150 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	418.30	1 tableta	13.94	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401663	C09DA04	irbesartan, hidrohlortiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (300 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	507.10	1 tableta	16.90	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401053	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	MICARDIS PLUS	tableta	28 po (80 mg + 12,5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	615.40	1 tableta	21.98	75%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401003	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (40mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	310.20	1 tableta	11.08	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401004	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	512.70	1 tableta	18.31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401005	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+25mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	550.00	1 tableta	19.64	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103672	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (40mg+12.5mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	332.40	1 tableta	11.08	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103671	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+12.5mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	549.30	1 tableta	18.31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103670	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+25mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	589.30	1 tableta	19.64	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401064	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 80mg+12,5mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	512.70	1 tableta	18.31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103706	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	TELSIDAN PLUS	tableta	28 po (80mg+12,5mg)	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C.Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija, Rumunija	512.70	1 tableta	18.31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103804	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tableta	blister, 28 po (80mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	227.80	1 tableta	8.14	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103805	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tableta	28 po (160mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	319.60	1 tableta	11.42	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103806	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tableta	28 po (160mg+10mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	346.70	1 tableta	12.38	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103643	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 5 mg)	Zdravlje AD Leskovac; Balkanpharma-Dupnitsa a.d.	Republika Srbija; Bugarska	342.60	1 tableta	11.42	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103641	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (80 mg + 5 mg)	Zdravlje AD Leskovac; Balkanpharma-Dupnitsa a.d.	Republika Srbija; Bugarska	244.10	1 tableta	8.14	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103645	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 10 mg)	Zdravlje AD Leskovac; Balkanpharma-Dupnitsa a.d.	Republika Srbija; Bugarska	371.50	1 tableta	12.38	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	230.60	30 mg	11.53	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132.10	30 mg	13.21	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	123.30	30 mg	13.21	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	215.30	30 mg	11.53	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	353.10	30 mg	9.46	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapije nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	132.10	30 mg	13.21	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	230.60	30 mg	11.53	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	378.30	30 mg	9.46	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	284.70	30 mg	14.24	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	438.60	30 mg	10.97	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	284.70	30 mg	14.24	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	438.60	30 mg	10.97	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	476.40	20 mg	7.94	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	476.40	20 mg	7.94	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	239.30	20mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	402.00	20mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	476.40	20mg	7.94	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	476.40	20 mg	7.94	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Lek Farmacevtska Družba D.D.	Slovenija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 20 mg	Lek Farmacevtska Družba D.D.	Slovenija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	196.60	10 mg	14.04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	446.90	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	540.30	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	527.20	10 mg	4.71	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	478.80	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	578.90	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104742	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	478.80	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104739	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	578.90	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	196.60	10 mg	14.04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	210.60	10 mg	14.04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	478.80	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	578.90	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104590	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	196.60	10 mg	14.04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104591	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	446.90	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104592	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis Ltd.	Malta	540.30	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104593	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Actavis Ltd.	Malta	527.20	10 mg	4.71	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	478.80	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	578.90	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemačka; Slovačka	564.90	10 mg	4.71	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	478.80	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	578.90	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	478.80	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	578.90	10 mg	9.65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula, tvrda	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d o o	Republika Srbija	442.20	0,2 g	18.43	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1104233	C10AB05	fenofibrat	ZYGLIP	tableta	blister, 30 po 145 mg	Alkaloid a.d.	Makedonija	420.00	0,2g	19.31	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1104235	C10AB05	fenofibrat	LIPANTHYL 145	film tableta	blister, 30 po 145 mg	Recipharm Fontaine; Mylan Laboratories SAS	Francuska; Francuska	498.00	0.2 g	22.90	60%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1104236	C10AB05	fenofibrat	FIBRETA	film tableta	blister, 30 po 160 mg	Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Poljska; Hrvatska	442.20	0.2 g	18.43	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1104010	C10BA04	simvastatin, fenofibrat	TREAKOL	film tableta	blister, 30 po (20mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	904.40	1 tableta	30.15	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104011	C10BA04	simvastatin, fenofibrat	TREAKOL	film tableta	blister, 30 po (40mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	1,142.50	1 tableta	38.08	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104622	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	220.80	1 tableta	7.36	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra
1104623	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	220.80	1 tableta	7.36	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra
1104624	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	349.70	1 tableta	11.66	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104625	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	349.70	1 tableta	11.66	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104640	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+2.5mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	816.90	1 kapsula	29.25	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104641	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+5mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	906.20	1 kapsula	32.36	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104642	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+10 mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	1,090.70	1 kapsula	38.95	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
4150400	D06AX07	gentamicin	GENTAMICIN	mast	tuba,1 po 15 g 0,1% (1 mg/1 g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	171.90	-	-	50%		
4139180	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	mast	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	255.50	-	-	50%		
4139160	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR ACTAVIS	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravlje a.d.; Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija; Republika Srbija	402.30	-	-	70%		
4090291	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	krem	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	255.50	-	-	50%		
4152104	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	krem	tuba, 1 po 20 g (0.5 mg/g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	285.60	-	-	75%		
4152100	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	mast	tuba, 1 po 20 g (0.5 mg/g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	285.60	-	-	75%		
4152255	D07AC03	dezoksimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION mite	krem	0,05%,ukupno 1 kom, tuba, 1 po 30g	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	123.10	-	-	50%		
4152253	D07AC03	dezoksimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION M	mast	0.25%; tuba; 1 po 30g	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	294.70	-	-	75%		
4152254	D07AC03	dezoksimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION	krem	tuba 1 po 30g , 0,25%,	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	294.70	-	-	75%		
4153440	D07AC13	mometazon	ELOCOM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	244.40	-	-	80%		
4153441	D07AC13	mometazon	ELOCOM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	244.40	-	-	80%		
1155442	D10BA01	izotretinoin	ROACCUTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1,105.70	30 mg	110.57	25%	Akne conglobata (L70.1).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
6137312	G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin b	POLYGYNAX	vaginalna kapsula meka	blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)	Innothera Chouzy	Francuska	679.40	-	-	70%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137510	G01AF12	fentikonazol	LOMEXIN	vaginalna kapsula	1 po 600 mg	Catalent Italy S.P.A.	Italija	279.00	0,1 g	46.50	85%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
4157290	G01AF15	butokonazol	GYNOFORT	vaginalni krem	aplikator, 1 po 5 g (20 mg/g)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	423.20	0,1 g	423.20	90%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1149080	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	244.80	75 mcg	81.60	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1149081	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 30 po 75 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	2,096.30	75 mcg	69.88	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1135300	G03AA10	gestoden, etinilestradiol	LINDYNETTE 20	obložena tableta	blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	388.40	0,75 tabl.	13.87	75%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135287	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol	DAYLETTE	film tableta	blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	539.20	1 tableta	19.26	80%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135288	G03AA15	hlormadinon, etinilestradiol	BELARA	film tableta	blister, 21 po (2mg + 0.03mg)	GEDEON RICHTER PLC.	Mađarska	931.60	0.75 tableta	33.27	90%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048293	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	484.50	10 mg	24.23	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048790	G03FA17	drospirenon, estradiol	ANGELIQ	film tableta	blister, 28 po (2 mg +1 mg)	Bayer AG; Bayer Farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	1,302.70	1 tableta	46.53	85%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiolvalerat	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO KG	Nemačka	191.20	0,75 tabl.	6.83	25%	Menopauza (N95)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Francuska; Nemačka	2,223.70	0,1 g	88.95	25%	Maligni tumor prostate (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1048176	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol	DIANE-35	obložena tableta	blister,1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)	Bayer Pharma AG; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	421.40	0,75 tabl.	15.05	15%	1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju; 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1048720	G03HB01	estradiol ciproteron	CLIMEN	obložena tableta	blister; 11 x 2mg + 10 x (2mg+1mg)	Delpharm Lille Sas	Francuska	515.00	0,75 tabl.	18.39	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1139173	G04BD07	tolterodin	DETRUSITOL	film tableta	blister, 28 po 2 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1,052.20	4 mg	75.16	70%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139022	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	418.10	5 mg	41.81	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139020	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1,254.30	5 mg	41.81	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139021	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1,676.60	5 mg	27.95	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139028	G04BD08	solifenacin	SOLIPHAR	film tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1,254.30	5 mg	41.81	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139027	G04BD08	solifenacin	SOLIPHAR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1,676.60	5 mg	27.95	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139025	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1,254.30	5 mg	41.81	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139026	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1,676.60	5 mg	27.95	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139668	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	418.10	5 mg	41.81	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139667	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	1,254.30	5 mg	41.81	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139666	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	1,676.60	5 mg	27.95	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139010	G04BD09	trospijum hlorid	INKONTAN	film tableta	blister, 20 po 15 mg	Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H	Austrija	494.10	40 mg	65.88	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139012	G04BD09	trospijum hlorid	INKONTAN	film tableta	blister, 20 po 30 mg	Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H	Austrija	912.60	40 mg	60.85	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139051	G04BD12	mirabegron	BETMIGA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 50 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	3,377.40	50mg	112.58	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134260	G04CA02	tamsulosin	TAMSULOSIN PHARMAS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134501	G04CA02	tamsulosin	OMSAL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134355	G04CA02	tamsulosin	TANYZ	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134242	G04CA02	tamsulosin	TAMLOS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134667	G04CA02	tamsulosin	TAMPROST	tableta sa produženim oslobađanjem	30 po 0,4mg	Salutas Pharma GmBH; Lek Pharmaceuticals D.D; Lek S.A; Salutas Pharma GmBH; Lek farmaceutska družba D.D	Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134666	G04CA02	tamsulosin	TAMSUDIL T	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,4 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Hrvatska	360.90	0,4 mg	12.03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134243	G04CA53	tamsulosin, solifenacin	VESOMNI	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po (0,4 mg + 6 mg)	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	3,302.50	1 tableta	110.08	85%	1. Iritabilna bešika (N39.4) 2. Urinarna inkontinencija (N39.3) 3. Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	381.90	5 mg	13.64	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134228	G04CB01	finasterid	BENEPROST	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	315.30	5 mg	10.51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134212	G04CB01	finasterid	FINASTERID PHARMAS	film tableta	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	294.30	5 mg	10.51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1134266	G04CB01	finasterid	MOLUSKAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Teva Gyogyszergyar ZRT	Madarska	294.30	5mg	10.51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134351	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tableta	blister, 30 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	315.30	5 mg	10.51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134350	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tableta	blister, 28 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	294.30	5 mg	10.51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1113413	G04CB02	dutasterid	DATUST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	627.10	0,5 mg	20.90	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134307	G04CB02	dutasterid	DUTASTERID ADOC	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon Farma, S.A.	Španija	627.10	0,5 mg	20.90	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134261	G04CB02	dutasterid	DUTRYS	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon farma, S.A.; Krka d.d., Novo Mesto	Španija; Slovenija	627.10	0,5 mg	20.90	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134305	G04CB02	dutasterid	AVODART	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	815.20	0,5 mg	27.17	85%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1,953.10	240 mcg	260.41	10%		
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3,884.60	240 mcg	258.97	10%		
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 2,4 ml (20 mcg/80 mcl)	Lilly France	Francuska	32,361.60	20 mcg	1,155.77	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjenje pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0040241	H05AA02	teriparatid	TERIPARATID PLIVA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjen injekcioni pen, 1 po 2,4 ml (20mcg/80µL)	Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergzar ZRT	Holandija; Hrvatska; Madarska	23,417.70	20 mcg	836.35	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjenje pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	325.30	1 g	86.75	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	696.50	1 g	69.65	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	350.10	1 g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	348.30	1 g	69.66	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	250.10	1 g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	522.40	1 g	69.65	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	Glaxo Wellcome Production; Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.	Francuska; Poljska	434.50	1 g	35.47	60%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021561	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blister,14 po (500mg+125mg)	Belupo,ljekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	487.60	1g	69.66	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021562	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blister,14 po (875mg+125mg)	Belupo,lekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41: J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36; N37, N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021611	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	522.40	1g	69.65	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41: J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37, N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021610	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	250.10	1g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41: J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37, N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021563	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	film tableta	strip, 14 po 875mg+125mg	PharmaS d.o.o.	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41: J42), 2 Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37, N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1321900	J01DB05	cefadroksil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister,16 po 500 mg	Alkaloid AD Skoplje	Republika Makedonija	388.00	2g	97.00	40%	1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	325.60	0,5 g	65.12	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40, J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	412.70	0,5 g	41.27	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	642.10	0,5 g	45.86	55%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.	Turska	412.70	0.5 g	41.27	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321195	J01DC04	cefahlor	ALFACET	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	778.40	1 g	97.30	60%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GMBH	Nemačka	1,286.50	1 g	257.70	85%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8: J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2 Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	515.60	0,4 g	51.56	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32: J40; J41: J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65, H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	257.80	0,4 g	51.56	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32: J40; J41: J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321521	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d	Republika Makedonija	315.40	0,4 g	126.16	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00: N10; N30; N34)	
1321523	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	631.00	0,4 g	126.20	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00: N10; N30; N34).	
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	412.00	0,3 g	82.40	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06,J15.7,J16.0. J20-J32, J40 J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	355.70	0,5 g	25.41	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	197.50	0,5 g	28.21	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	395.00	0,5 g	28.21	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S r l	Italija	355.70	0,5 g	25.41	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	197.50	0,5 g	28.21	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	202.50	0,3 g	40.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	202.50	0,3 g	40.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325572	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Special Product's Line S.P.A.	Italija	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	257.30	1,2 g	85.77	25%		
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	482.00	1,2 g	80.33	25%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,205.00	1,2 g	80.33	25%		
1329350	J01MA01	ofloksacin	VISIREN	film tableta	10 po 200 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	213.40	0,4 g	42.68	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.
1329371	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	film tableta	blister, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	683.90	0,5 g	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329380	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	410.10	0,5 g	82.02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329381	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	683.90	0,5 g	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329455	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	410.10	0,5 g	82.02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329456	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	683.90	0,5 g	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329104	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	410.10	0,5 g	82.02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329105	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	683.90	0,5 g	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329506	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	287.10	0,5 g	82.03	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329505	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	478.70	0,5 g	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329081	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	410.10	0,5 g	82.02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01), 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329080	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alvogen Pharma d.o.o ; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	683.90	0,5 g	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329375	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tableta	10 po 250 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	410.10	0,5 g	82.02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329376	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tableta	10 po 500 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	683.90	0,5 g	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329095	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 250mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d;Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	410.10	500 mg	82.02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2 Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329098	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 500mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d;Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	683.90	500 mg	68.39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15)	
1329001	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	675.40	0,4 g	67.54	30%	1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1329006	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tableta	blister, 7 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	472.80	0.4 g	67.54	30%	1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1329007	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	675.40	0.4 g	67.54	30%	1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1132320	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEM	kapsula	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	300.00	0,8 g	60.00	25%		
1132300	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEGAL	kapsula	20 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	300.00	0,8 g	60.00	25%		
3029730	J01XX01	fosfomicin	MONURAL	granule za oralni rastvor	kesica, 1 po 8g (3g fosfomicina)	Zambon Switzerland Ltd	Švajcarska	300.00	3 g	300.00	25%	Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih patogenima osetljivim na fosfomicin kod osoba starijih od 12 godina (N30.0).	
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151.90	0,2 g	202.53	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d	Republika Srbija	151.90	0,2 g	86.80	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327401	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	151.90	0,2 g	86.80	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327400	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	151.90	0,2 g	202.53	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1327402	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 10 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	701.30	0,2 g	140.26	30%	1. Tinea corpons disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1327403	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	350.70	0,2 g	140.28	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1039010	L02BA01	tamoksifen	NOLVADEX	film tableta	blister, 30 po 10 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	282.40	20 mg	18.83	40%		
1037200	L02BB01	flutamid	FLUTASIN	tableta	boca staklena, 90 po 250 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	3,596.50	0,75 g	119.88	20%	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1039325	L02BG03	anastrozol	ARIMIDEX	film tableta	blister, 28 po 1 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1,375.80	1 mg	49.14	10%	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1014301	L04AA13	leflunomid	ARAVA	film tableta	bočica, 30 po 20 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	4,263.50	20 mg	142.12	10%	1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije; 2. Aktivni psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1059079	M05BA04	alendronska kiselina	BONAP	tableta	blister, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	617.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059908	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	617.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059909	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1,234.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059907	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1,851.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059903	M05BA04	alendronska kiselina	FOROSA	film tableta	blister, 4 po 70 mg	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	617.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	482.20	6 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	film tableta	blister, 1 po 150 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	462.20	5 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoze verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059095	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Mađarska	462.20	5 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoze verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059000	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Stada Arzneimittel AG, Stadapharm GmbH; Synthon Hispania, S.L	Nemačka; Nemačka, Španija	462.20	5 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoze verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059121	M05BB03	alendronska kiselina, holekalciferol	FOSAVANCE	tableta	blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)	Merck Sharp & Dohme S.P.A.	Italija	926.00	10 mg	33.07	55%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoze verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	727.50	1,2 mg	41.57	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1,455.00	1,2 mg	41.57	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola. -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2,468.50	1,2 mg	47.02	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2,436.20	1,2 mg	34.83	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	727.50	1,2 mg	42.33	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	1,455.00	1,2 mg	42.33	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2,466.50	1,2 mg	47.87	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2,438.20	1,2 mg	35.46	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kauzalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 50 mg	Slavlamed d.o.o.	Republika Srbija	210.10	50 mg	105.05	50%	Migrena (G43).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086730	N02CC07	frovatriptan	FROVAMAX	film tableta	blister, 2 po 2,5 mg	A. Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.R.L.; Laboratorios Menarini S.A.	Italija; Španija	550.90	2,5 mg	275.45	85%	Migrena (G43)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	766.60	1,8 g	92.23	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	766.60	1,8 g	92.23	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084821	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	UCB Pharma SA	Belgija	884.70	1,5 g	88.47	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4.. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084820	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	UCB Pharma SA	Belgija	1.619,20	1,5 g	80.96	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4.. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084822	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	UCB Pharma SA	Belgija	3.130,60	1,5 g	78.27	25%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4.. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	368.90	0,3 g	79.05	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1,441.20	0,3 g	51.47	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,468.50	0,3 g	44.08	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	971.80	0,3 g	64.79	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1,544.20	0,3 g	51.47	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2,002.90	0,3 g	133.53	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.246,20	0,3 g	133.52	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084108	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 75mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084131	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 100mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,584.60	0,3 g	84.89	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,441.20	0,3 g	51.47	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 300mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2,466.50	0,3 g	44.08	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084144	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan B.V.; Modernott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija; Irska; Mađarska	907.00	0.3 g	64.79	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084145	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan B.V.; Modernott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija; Irska; Mađarska	1,441.20	0.3 g	51.47	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1085271	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	boca plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	4,720.60	0,45 g	212.43	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085272	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	boca plastična, 100 po (150 mg + 37,5 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	4,959.40	0,45 g	148.78	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085000	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (100mg+25mg+200 mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	3,825.60	0,45 g	172.15	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085009	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (150mg+37,5mg+200mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	3,851.60	0,45 g	115.55	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085002	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (200mg+50mg+200 mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	3,877.60	0,45 g	87.25	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085344	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	545.70	6 mg	58.47	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085348	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1,062.30	6 mg	56.91	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085349	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1,849.00	6 mg	49.53	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085363	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d d	Slovenija	474.40	6 mg	50.83	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085364	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	923.70	6 mg	49.48	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085365	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,607.90	6 mg	43.07	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085290	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	389.20	2,5 mg	129.73	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085291	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 1 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1,538.00	2,5 mg	128.17	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085081	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 0,375 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	221.20	2,5 mg	147.47	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085082	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1,327.70	2,5 mg	147.52	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085084	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	2,534.50	2,5 mg	140.81	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085083	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	4,659.90	2,5 mg	129.44	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085294	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	4,555.60	2,5 mg	168.73	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085295	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	5,824.10	2,5 mg	129.42	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085292	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	350.40	2,5 mg	116.80	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085293	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,346.90	2,5 mg	112.24	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085066	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,26 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	534.30	2,5 mg	118.73	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085064	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,52 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,075.40	2,5 mg	119.49	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085062	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,05 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,949.60	2,5 mg	108.31	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085060	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,57 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	3,504.30	2,5 mg	129.79	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085058	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,1 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	3,584.60	2,5 mg	99.57	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085080	N04BD02	rasagilin	AZILECT	tableta	blister, 28 po 1 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP. Z.O.O.	Holandija; Hrvatska; Poljska	4,713.60	1 mg	168.35	75%	Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1085284	N04BX02	entakapon	COMTAN	film tableta	bočica staklena, 30 po 200 mg	Novartis Pharma GmbH; Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Nemačka; Velika Britanija	2,347.10	1 g	391.18	60%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1070961	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula	30 po 40 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,619.60	80 mg	174.65	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070650	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 60 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,619.60	60 mg	116.44	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070651	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 80 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,619.60	80 mg	87.33	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070965	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blister, 50 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1,085.60	0,3 g	65.14	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070963	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blister, 50 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	314.60	0,3 g	75.50	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) I drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070022	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	50 po 100 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	1,085.60	0,3 g	65.14	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070020	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	blister, 50 po 25 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	314.60	0,3 g	75.50	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070606	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Mylan Hungary Kft.	Mađarska	1,085.60	0,3 g	65.14	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Mylan Hungary Kft.	Mađarska	314.60	0,3 g	75.50	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070944	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1,083.90	0,4 g	144.52	75%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070939	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 400 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	3,557.40	0,4 g	59.29	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070945	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	597.00	0,4 g	159.20	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070946	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Krka Tovarna Zdravil d d	Slovenija	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070948	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070859	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 25 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	597.00	0,4 g	159.20	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070858	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 100 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070857	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 200 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070906	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta, Island	597.00	0,4 g	159.20	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070907	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister,60 po 100 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta, Island	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070909	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta, Island	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070955	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Belupo,ljekovi i kozmetika dd	Hrvatska	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070956	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister,60 po 200 mg	Belupo,ljekovi i kozmetika dd	Hrvatska	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070331	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	833.60	0,4 g	111.17	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070332	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 150 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1,483.70	0,4 g	65.94	40%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070330	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 200 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1,791.10	0,4 g	59.70	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070333	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 300 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	2,887.30	0,4 g	64.16	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena,100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1,462.40	5 mg	73.12	25%	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1071710	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM HF	tableta	30 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	111.60	2,5 mg	9.32	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071711	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM HF	tableta	20 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	123.90	2,5 mg	6.20	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071720	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	71.00	10 mg	15.78	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071721	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	95.00	10 mg	10.56	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071722	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blister, 20 po 6 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	87.00	10 mg	7.25	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071624	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	71.00	10 mg	15.78	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071626	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	95.00	10 mg	10.56	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071320	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	71.00	10 mg	15.78	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071322	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	95.00	10 mg	10.56	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa)
1071324	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	130.50	10 mg	7.25	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071750	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	55.70	1 mg	7.43	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071751	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	90.90	1 mg	6.06	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071752	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	184.60	1 mg	6.15	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071755	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d., Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	55.70	1 mg	7.43	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071756	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 0,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	90.90	1 mg	6.06	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071757	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 1 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija, Hrvatska	184.60	1 mg	6.15	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077260	N05CD02	nitrazepam	NIPAM	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	63.90	5 mg	6.39	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077196	N05CD02	nitrazepam	CERSON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	63.90	5 mg	6.39	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071461	N05CD08	midazolam	FLORMIDAL	film tableta	blister, 30 po 15 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	889.30	15 mg	29.64	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077151	N05CF02	zolpidem	STILNOX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	84.50	10 mg	4.23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077301	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	83.10	10 mg	8.31	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077300	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	84.50	10 mg	4.23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa
1077302	N05CF02	zolpidem	BELBIEN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	84.50	10 mg	4.23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077311	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	83.10	10 mg	8.31	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077313	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	84.50	10 mg	4.23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072740	N06AA04	klomipramin	ANAFRANIL	obložena tableta	30 po 25 mg	Novartis Farma S.P.A.	Italija	276.30	0,1 g	36.84	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072910	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; S.C. Europharm S.A.	Poljska; Rumunija	252.40	20 mg	8.41	35%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072782	N06AG02	moklobemid	AURORIX	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S.	Nemačka; Francuska	1,492.90	0,3 g	49.76	65%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1072750	N06AX03	mianserin	TOLVON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	N.V. Organon	Holandija	597.50	60 mg	39.83	65%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072631	N06AX05	trazodon	TRITTICO Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	20 po 150 mg	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.	Italija	511.90	0,3 g	51.19	75%	1. Depresija (F32) 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1 i 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1072705	N06AX11	mirtazapin	CALIXTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	289.00	30 mg	9.63	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072861	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	289.00	30 mg	9.63	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072050	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blister, 30 po 30mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	289.00	30 mg	9.63	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072051	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blister, 30 po 45mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	625.40	30 mg	13.90	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089141	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 150 mg	Aspen Bad Oldesloe GmbH	Nemačka	1,243.20	300 mg	82.88	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4; F33.8; F33.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089140	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 300 mg	Aspen Bad Oldesloe GmbH	Nemačka	2,150.00	300 mg	71.67	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4; F33.8; F33.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa
1072600	N06AX14	tianeptin	COAXIL	obložena tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	451.60	37,5 mg	45.18	60%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072992	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobadjanjem, tvrda	blister, 28 po 75 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	328.00	0,1 g	15.62	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072990	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobadjanjem, tvrda	blister, 28 po 150 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	544.10	0,1 g	12.95	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072489	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 37,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	262.70	0,1 g	23.35	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072488	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	351.40	0,1 g	15.62	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072487	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 150 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	583.00	0,1 g	12.96	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072855	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX	tableta	blister, 28 po 37,5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	245.20	0,1 g	23.35	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072856	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX	tableta	blister, 28 po 75 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	328.00	0,1 g	15.62	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072037	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 30 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	557.00	60 mg	39.79	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropatski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072036	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 60 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1,112.00	60 mg	39.71	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropatski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072870	N06AX22	agomelatin	MELITOR	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie; Laboratorios Servier S.L.	Poljska; Irska; Francuska; Španija	2,775.70	25 mg	99.13	90%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079030	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	875.50	7,5 mg	46.90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079031	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079600	N06DA02	donepezil	YASNAL Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	875.50	7,5 mg	46.90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079602	N06DA02	donepezil	YASNAL Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079051	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	875.50	7,5 mg	46.90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079050	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079501	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed-pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	875.50	7,5 mg	46.90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079500	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed-pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079041	N06DA02	donepezil	DONECEPT	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje AD;Actavis LTD	Republika Srbija;Malta	875.50	7,5 mg	46.90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1079035	N06DA02	donepezil	DONECEPT	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje AD;Actavis LTD	Republika Srbija;Malta	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079110	N06DA02	donepezil	DONECEPT ODT	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska; Hrvatska	875.50	7,5 mg	46.90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079111	N06DA02	donepezil	DONECEPT ODT	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska; Hrvatska	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088012	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	213.56	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa
1088013	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	106.78	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088014	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	71.19	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088015	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	53.39	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088200	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	996.60	9 mg	213.56	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088201	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 3,0mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	996.60	9 mg	106.78	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088202	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 4.5mg	Krka Tovarna Zdravil d d	Slovenija	996.60	9 mg	71.19	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2 Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa
1088203	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	996.60	9 mg	53.39	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
9088225	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH	Švajcarska; Nemačka	3,489.90	9 mg	227.60	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30. F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
9088226	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH	Švajcarska; Nemačka	3,489.90	9 mg	110.21	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30. F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
9088227	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	30 po 13.3mg/24h	Novartis Pharma Stein AG, Novartis Pharma GMBH	Švajcarska, Nemačka	3,489.90	9,5 mg	83.09	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30. F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079000	N06DA04	galantamin	ALZAMIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,528.70	16 mg	101.91	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079002	N06DA04	galantamin	ALZAMIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 16 mg	PharmaSwiss d o o	Republika Srbija	2,049.70	16 mg	68.32	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa
1079003	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	710.90	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079007	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,421.80	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079033	N06DX01	memantin	NEMDATINE	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a d ; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	710.90	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30, F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079028	N06DX01	memantin	NEMDATINE	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	1,421.80	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079004	N06DX01	memantin	YMANA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	1,421.80	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1075310	N07BB03	akamprosat	CAMPRAL	gastrorezistentna tableta	blister, 84 po 333mg	Merck S.L; Merck Sante S.A.S	Španija; Francuska	1,127.70	2 g	80.63	90%	Održavanje apstinencije kod pacijenata zavisnih od alkohola u kombinaciji sa psihološkim savetovanjem (F10).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1182031	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH; Amomed Pharma GmbH	Nemačka; Austrija	3,425.20	50 mg	122.33	75%	Održavanje opijatske zavisnosti (F11).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1182051	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	345.60	8 mg	197.60	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica" - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182052	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 8 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1,158.70	8 mg	165.53	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica" - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
7110022	R01AD01	beklometazon	BECONASE	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 200 po 50 mcg/doza	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome S.A.	Poljska; Španija	383.20	0,4 mg	15.33	35%		
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1,832.40	100 mcg	61.08	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,119.40	24 mcg	74.63	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2 Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,754.30	24 mcg	58.48	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114167	R03AC13	formoterol	ATIMOS	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (12 mcg/doza)	Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija; Austija	3,167.90	24 mcg	52.80	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114164	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	prašak za inhalaciju	tvrda kapsula, blister 30 po150mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2,675.30	0,15mg	89.18	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	1,898.60	2 inh.	63.29	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,363.10	2 inh.	78.77	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,109.70	2 inh.	103.66	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	2,014.10	2 inh.	67.14	25%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	2,650.30	2 inh.	88.34	25%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114677	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALMETEROL/ FLUTIKAZONPROPIONAT	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+125mcg/doza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	2,014.10	4 inh.	67.14	30%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114678	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALMETEROL/ FLUTIKAZONPROPIONAT	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/doza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	2,650.30	4 inh.	88.34	30%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	formoterol budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,598.40	4 inh.	106.56	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114711	R03AK07	formoterol budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,597.30	4 inh.	106.49	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114610	R03AK07	formoterol budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2,922.60	4inh	97.43	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2,864.10	2 inh.	95.47	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114714	R03AK07	formoterol budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,922.60	4 inh.	97.43	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114713	R03AK07	formoterol budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,864.10	2 inh.	95.47	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114246	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (6 mcg/doza + 100 mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	4,890.60	4 inh.	108.68	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,719.00	1 doza	90.63	40%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,511.10	1 doza	117.04	40%	Bronhijalna astma (J45)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114675	R03AL03	vilanterol, umeklidinijum-bromid	ANORO ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg/doza + 55mcg/doza)	Glaxo Welcome Operations	Velika Britanija	3,270.10	1 inh.	109.00	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114171	R03AL04	indakaterol, glikopironijum-bromid	ULTIBRO BREEZHALER	prašak za inhalaciju, kapsula tvrda	blister + inhaler, 30 po (85mcg + 43mcg)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4,447.50	1 inh.	148.25	35%	Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhodilatatora (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114247	R03AL06	olodaterol, tiotropijum-bromid	SPIOLTO RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potisika (30 doza) (2.5mcg/potisak+2.5 mcg/potisak)	Boehgringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.Kg	Nemačka	4,005.30	2 inh.	133.51	35%	Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhodilatatora (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	689.90	800 mcg	27.60	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,971.20	800 mcg	39.42	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	773.20	0,6mg	61.86	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1,404.50	0,6mg	56.18	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom,1 po 60 doza (160 mcg/doza)	Takeda GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	1,854.60	0,16 mg	30.91	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Takeda GmbH, AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	2,580.60	0,16 mg	43.01	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114730	R03BB04	tiotropium-bromid	SPIRIVA	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 18 mcg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	2,699.00	18 mcg	89.97	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114732	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	2,699.00	5 mcg	89.97	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114001	R03BB05	aklidinijum-bromid	BRETARIS GENUAIR	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (322mcg)	Industrias Farmaceuticas Almirall SA	Španija	3,265.60	0,644mg	108.85	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114733	R03BB06	glikopironijum-bromid	SEEBRI BREEZHALER	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister,30 po 44mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2,963.80	44mcg	98.79	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114003	R03BB07	umeklidinijum bromid	INCRUSE ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/doza)	Glaxo Welcome Operations	Velika Britanija	2,801.80	55mcg	93.39	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	679.50	10 mg	24.27	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	679.50	10 mg	24.27	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	679.50	10 mg	24.27	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1119220	R03DX07	roflumilast	DAXAS	film tableta	blister, 30 po 500 mcg	Takeda GmbH	Nemačka	4,304.50	0,5 mg	143.48	60%	Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftizioloqa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
3114450	R06AX17	ketotifen	GALITIFEN	sirup	1 po 100 ml (1 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	161.70	2 mg	16.17	50%		Samo za decu stariju od 2 godine.
4090290	S01AD03	aciklovir	ZOVIRAX	mast za oči	tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	795.70	-	-	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa
7090912	S01AE05	levofloksacin	LEXAVON	kapi za oči, rastvor	boca sa kapaljkom, 1 po 5ml (5mg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	489.40	-	-	90%	Bakterijski konjuktivitis (H10.0)	
7090011	S01AE07	moksifloksacin	VIGAMOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	579.10	-	-	90%	Bakterijski konjuktivitis (H10.0)	
7090852	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	kapi za oči, rastvor	plastična bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (3 mg/ml)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	237.60	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0)	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4090851	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	mast za oči	1 po 3 g (3 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	275.50	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
7099200	S01BC01	indometacin	INDOCOLLYRE	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (1 mg/ml)	Laboratoire Chauvin S.A., Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH	Francuska; Nemačka	272.90	-	-	75%		
7090813	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	217.70	-	-	50%		
4090921	S01CA01	deksametazon, gentamicin	DEXAMYTREX	mast za oči	tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	273.60	-	-	50%		
7094070	S01EA05	brimonidin	ALPHAGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	343.10	0,2 ml	13.72	40%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094080	S01EA05	brimonidin	BRIMONAL 0,2%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	527.80	0,2 ml	10.56	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094078	S01EA05	brimonidin	BRIMONIDINE PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	263.90	0,2 ml	10.56	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099086	S01EC54	brinzolamid, brimonidin	SIMBRINZA	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml + 2 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.	Belgija	1,329.00	0,2 ml	53.16	40%	Smanjenje povišenog intraokularnog pritiska (IOP) kod odraslih pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla ili očnom hipertenzijom kod kojih monoterapija ne dovodi do dovoljnog smanjenja IOP (H40)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099090	S01ED51	timolol, bimatoprost	GANFORT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1,539.20	0,1 ml	51.31	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099180	S01ED51	dorzolamid, timolol	COSOPT	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 5 ml (2% + 0,5%)	Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret	Francuska	405.60	0,2 ml	16.22	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099170	S01ED51	timolol, latanoprost	XALACOM	kapi za oči, rastvor	1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	565.10	0,1 ml	22.60	30%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099177	S01ED51	timolol, travoprost	DUOTRAV	kapi za oči, rastvor	boca sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,366.50	0,1ml	54.66	45%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099175	S01ED51	timolol, brinzolamid	AZARGA	kapi za oči, suspenzija	boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,168.00	0,2 ml	46.72	20%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099188	S01ED51	timolol, brimonidin	COMBIGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml (5mg/ml + 2mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	837.30	0,2 ml	33.49	60%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099145	S01EE03	bimatoprost	LUMIGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1,396.70	0,1 ml	46.56	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099190	S01EE04	travoprost	TRAVATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (40 mcg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,018.50	0,1 ml	40.74	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099195	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1,532.50	0,3 ml	51.08	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090791	S03CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	217.70	-	-	50%		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0126620	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	205.60	0,3 g	246.72	-		
0122120	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 40 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.	Portugalija	327.40	20 mg	163.70	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122751	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 40 mg	Takeda GmbH	Nemačka	231.90	40 mg	231.90	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122927	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 40 mg	Krka d.d.	Slovenija	231.90	40 mg	231.90	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122928	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 40 mg	Krka d.d.	Slovenija	1,159.40	40 mg	231.88	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122100	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL Sandoz	prašak za rastvor za injekciju	1 po 40mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	231.90	40mg	231.90	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122813	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 40 mg	AstraZeneca AB	Švedska	4,032.90	30 mg	302.47	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan)	
0122814	A02BC05	esomeprazol	PEPTIX	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bocica staklena, 10 po 40mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	4,032.90	30 mg	302.47	-	STAC; Za lecenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograniceniem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0123138	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (1mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	472.70	1,5 mg	70.91	-		
0123137	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 1 ml (1mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	4,726.80	1,5 mg	70.90	-		
0123140	A03BB01	hioscin-butilbromid	BUSCOPAN	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Španija	202.00	60 mg	101.00	-		
0124302	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	rastvor za injekciju	ampula,10 po 2 ml (10 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	209.50	30 mg	62.85	-		
0124530	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 mg/2 ml	Sloviamed d.o.o.	Republika Srbija	1,367.40	16 mg	1,093.92	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124531	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 4mg/2ml, 1 po 2ml	Vianex S.A	Grčka	273.50	16 mg	1,094.00	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 8mg/4ml, 1 po 4ml	Vianex S.A	Grčka	624.60	16 mg	1,249.20	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124535	A04AA01	ondansetron	ONDANSETRON PEYTON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (4mg/2ml)	Peckforton Pharmaceuticals Limited; Peckforton Pharmaceuticals Limited; Sidefarma-SOC. Industriol Expansao Farmaceutica, S.A.; UAB Norameda	Velika Britanija; Veliko Britanija; Portugalija; Litvanija	1,367.40	16 mg	1,093.92	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124574	A04AA05	palonosetron	ALOXI	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (250 mcg/5 ml)	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.	Irska; Republika Srbija	5,383.20	0,25 mg	5,383.20	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
1124588	A04AA55	palonosetron, netupitant	AKYNZEO	kapsula, tvrda	blister, 1 po (0.5mg+300mg)	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.	Irska	6,973.90	1 kapsula	6,973.90	-	Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja izazvanih visoko emetogenom antineoplastičnom hemioterapijom na bazi cisplatina (T66.7, Y43.3)	STAC
1124587	A04AD12	aprepitant	EMEND	kapsula, tvrda	blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	5,868.50	95 mg	1,956.17	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
0127452	A05BA..	ornitinaspartat	HEPA-MERZ	rastvor za infuziju	10 po (5 g/10 ml)	Merz Pharma GmbH	Nemačka	4,736.80	-	-	-		STAC
3125300	A06AD65	makrogol, natrijum-hlorid, kalijum hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat	FORTRANS	prašak za oralni rastvor	kesica, 4 po 74 g (64g+1,46g+0,75g+1,68g +5,7g)	Beaufour Ipsen Industrie	Francuska	730.60	-	-	-		STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
4129930	A07EA06	budesonid	BUDENOFALK	rektalna pena	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 14 po 1.2g (2mg/doza)	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	6,629.00	1 doza	473.50	-	Ulcerozni kolitis (K51)	
5129473	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	rektalna suspenzija	boca plastična, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3,314.40	1,5 g	177.56	-	Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.	
5129132	A07EC02	mesalazin	PENTASA	rektalna suspenzija	bočica, 7 po 100 ml (1 g/100 ml)	Ferring-Leciva, A.S.	Češka	1,805.20	1,5 g	386.83	-	Ulcerozni kolitis (K51)	
0051750	A11DA01	tiamin	VITAMIN B1 ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	2,028.70	50 mg	20.29	-		
0052184	A11EA..	vitamini B-kompleksa (tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin)	BEVIPLEX	liofilizat za rastvor za injekciju	5 x (40 mg + 4 mg +8 mg + 100 mg + 10 mg +0,004 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	607.30	-	-	-		
0051645	A11GA01	askorbinska kiselina	VITAMIN C	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 5 ml (500 mg/5 ml)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	1,899.00	0,2 g	15.19	-		
0051351	A11HA02	piridoksin (vitamin B6)	BEDOXIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,040.10	0,15 g	66.57	-		
0050150	A11JA..	retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol	VITALIPID N INFANT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2,929.30	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti	
0050151	A11JA..	retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol	VITALIPID N ADULT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2,329.80	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).	
1174015	A16AA..	alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin	KETOSTERIL	film tableta	blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 36 mg + 30 mg)	Labesfal-Laboratories Almiro S.A.	Portugalija	4,706.30	-	-	-	Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062036	B01AB01	heparin	HEPARIN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	421.70	10000 i.j.	168.68	-		
0062037	B01AB01	heparin	HEPARIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	3,094.90	10000 i.j.	123.80	-		
0062039	B01AB01	heparin-natrijum	HEPARIN PANPHARMA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 5 ml (25000 i.j./5 ml)	Panpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH. Nemačka	Francuska	3,094.90	10000 i.j.	123.80	-		
0062161	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III BAXTER	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)	Baxter AG	Austrija	25,735.10	2100 i.j.	108,087.42	-	1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III. 2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.	
0062162	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III BAXTER	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)	Baxter AG	Austrija	51,469.90	2100 i.j.	108,086.79	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062170	B01AB02	antitrombin III	KYBERNIN P 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	25,735.10	2100 i.j.	108,087.42	-	1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III. 2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III	
0062163	B01AB02	antitrombin III	ATENATIV 500	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)	Octapharma AB	Švedska	25,735.10	2100 i.j.	108,087.42	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062164	B01AB02	antitrombin III	ATENATIV 1000	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (50 i.j./ ml)	Octapharma AB	Švedska	51,469.90	2100 i.j.	108,086.79	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062210	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric,10 po 2500 i.j./0.2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1,679.40	2500 i.j.	167.94	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062211	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric,10 po 5000 i.j./0.2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	3,081.60	2500 i.j.	154.08	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062212	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula,10 po 10000 i.j./1 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	4,791.50	2500 i.j.	119.79	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062205	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0.2 ml (2000 i.j /0.2 ml)	*Sanofi Winthrop Industrie*; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	2,074.10	2000 i.j.	207.41	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6 U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI)	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062205	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa igłom, 10 po 0.4 ml (4000 i.j./0.4 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	3,811.30	2000 i.j.	190.57	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulansa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062207	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa igłom, 10 po 0.6 ml (6000 i.j./0.6 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	5,015.00	2000 i.j.	167.17	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulansa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062208	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa igłom, 10 po 0.8 ml (8000 i.j./0.8 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	5,695.00	2000 i.j.	142.40	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulansa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062300	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 2850 i.j. /0,3ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	1,764.60	2850 i.j.	176.46	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulansa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062400	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 3800 i.j. /0,4ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	1,953.50	2850 i.j.	146.51	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulansa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062302	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 5700 i.j. /0,6ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	2,838.90	2850 i.j.	141.95	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulansa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0064130	B01AD02	alteplaza	ACTILYSE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	47,956.20	0,1 g	95,912.40	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0064060	B01AD11	tenekteplaza	METALYSE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	114,543.00	40 mg	91,634.40	-		
1069611	B01AE07	dabigatranetoksilat	PRADAXA	kapsula, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG	Nemačka	3,180.20	300 mg	424.03	-	Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1069614	B01AE07	dabigatraneteksilat	PRADAXA	kapsula, tvrda	blister, 30 po 110 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG	Nemačka	3,148.80	300 mg	286.25	-	Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
0062420	B01AX05	fondaparinuks-natrijum	ARIXTRA	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju , napunjen injekcioni špric, 10 po 2,5mg /0,5 ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	4,662.70	2,5mg	466.27	-	1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI); 2. Infarkt miokarda sa elevcijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče trombolitičkima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.	
1069600	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayor Pharma AG	Italija; Nemačka	2,138.60	10 mg	213.86	-	Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068025	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tablete	blister, 10 po 2,5 mg	Bristol Myers Squibb S.R.L	Italija	1,064.70	10mg	425.88	-	Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068026	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tablete	blister, 60 po 2,5 mg	Bristol Myers Squibb S.R.L	Italija	6,388.20	10mg	425.88	-	Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
0065040	B02AA02	traneksaminska kiselina	TRANEXAMIC MEDOCHEMIE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)	Medochemic Ltd. (Ampoule injectable facility)	Kipar	1,144.50	2 g	457.80	-	1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom; 2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.	
0050970	B02BA01	fitomenadion (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 mg/1 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	232.00	20 mg	92.80	-		
0050974	B02BA01	fitomenadion (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 mg/0.2 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	280.90	20 mg	561.80	-		
9067081	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Combi-Set 1ml	prašak i rastvarač za lepak za tkivo	bočica, 4 po 1 (set 1 mL): (90 mg/1mL + 60 i.j./1mL + 1000 KIU/1mL + 500 i.j./1mL + 5,9 mg /1mL)	CSL Behring GmbH	Nemačka	11,223.60	-	-	-		STAC
9067082	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Combi-Set 3ml	prašak i rastvarač za lepak za tkivo	bočica, 4 po 1 (set 3 mL): (270 mg/ 3mL + 180 i.j./ 3mL + 3000 KIU/ 3mL + 1500 i.j./ 3mL + 17,7mg/3mL)	CSL Behring GmbH	Nemačka	32,922.80	-	-	-		STAC
0066014	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	OCTANATE 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066012	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	OCTANATE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066013	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	OCTANATE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066610	B02BD02	koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066611	B02BD02	koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066612	B02BD02	koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)	ZLB Behring GmbH	Nemačka	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066630	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ml + 5ml vode za inj.)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066631	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica, 1 po 500 i.j.(50 i.j./ml + 10ml vode za inj.)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066632	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ml + 10 ml vode za inj.)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066907	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	KOATE-DVI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (250 i.ij /5 ml)	Grifols Therapeutics INC	SAD	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066908	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	KOATE-DVI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)	Grifols Therapeutics INC.	SAD	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066906	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	KOATE-DVI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)	Grifols Therapeutics INC.	SAD	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066105	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	EMOCLOT	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j/10ml)	Kedrion S.P.A	Italija	26,009.80	500 i.j	26,009.80	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066106	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	EMOCLOT	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j/10ml)	Kedrion S.P.A	Italija	52,019.50	500i.j	26,009.75	-		
0066905	B02BD02	oktokog alfa	KOGENATE BAYER	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (500 i.j./2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmaceutska družba d.o.o.	Italija; Slovenija	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066903	B02BD02	oktokog alfa	KOGENATE BAYER	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmaceutska družba d.o.o.	Italija; Slovenija	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066901	B02BD02	oktokog alfa	KOGENATE BAYER	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (1000 i.j./2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmaceutska družba d.o.o.	Italija; Slovenija	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066909	B02BD02	oktokog alfa	RECOMBINATE 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066910	B02BD02	oktokog alfa	RECOMBINATE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066911	B02BD02	oktokog alfa	RECOMBINATE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066918	B02BD02	oktokog alfa	ADVATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066917	B02BD02	oktokog alfa	ADVATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066916	B02BD02	oktokog alfa	ADVATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000 i.j./5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066770	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066771	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066772	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 i j /4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066773	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem,1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	107,113.20	500 i.j.	26,778.30	-		
0066180	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (250i.j/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0066181	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (500i.j/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		
0066182	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (1000 i.j/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066183	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (2000i.j/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	107,113.20	500 i.j.	26,778.30	-		
0069001	B02BD02	turoktokog alfa	NOVOEIGHT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem 1 po 4 ml (250i.j)	Novo Nordisk A/S	Danska	14,668.70	500 i.j.	29,337.40	-		
0069002	B02BD02	turoktokog alfa	NOVOEIGHT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem 1 po 4 ml (500i.j)	Novo Nordisk A/S	Danska	26,009.80	500 i.j.	26,009.80	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066003	B02BD02	turoktokog alfa	NOVOEIGHT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem 1 po 4 ml (1000 i.j)	Novo Nordisk A/S	Danska	52,019.50	500 i.j.	26,009.75	-		
0066044	B02BD03	antiinhibitorski kompleks faktora VIII	FEIBA NF	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1 po 20 ml (500i.j/20 ml)	Baxter AG	Austrija	50,056.70	10000 i.j.	1,001,134.00	-	Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0066007	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	OCTANINE F	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	24,307.60	350 i.j.	17,015.32	-		
0066171	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	IMMUNINE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	27,709.90	350 i.j.	16,164.11	-		
0066501	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	HAEMONINE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	24,307.60	350 i.j.	17,015.32	-		
0066500	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	HAEMONINE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	48,615.20	350 i.j.	17,015.32	-		
0066020	B02BD04	humani faktor koagulacije IX	AIMAFIX	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j/10ml)	Kedrion S.P.A	Italija	24,307.60	350 i.j	17,015.32	-		
0066110	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250i.j/5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	12,231.60	350 i.j	17,124.24	-		
0066111	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500i.j/5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	24,463.20	350 i.j	17,124.24	-		
0066112	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000i.j/5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	48,926.30	350 i.j	17,124.21	-		
0066113	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (2000i.j/5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	97,852.70	350 i.j	17,124.22	-		
0066200	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMATE P 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600i.j./5mL+250i.j./5mL)	CSL Behring GmbH	Nemačka	19,301.30	7200 i.j.	555,877.44	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066201	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMATE P 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1200i.j./10ml+500i.j./10 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	38,602.50	7200 i.j.	555,876.00	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066202	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMATE P 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 15 ml (2400i.j./15ml+1000i.j./15 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	77,204.90	7200 i.j.	555,875.28	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066210	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (190 i.j./5 ml + 250 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	13,388.10	7200 i.j.	385,577.28	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066212	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (375 i.j./5 ml + 500 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	26,776.20	7200 i.j.	385,577.28	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066211	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (750 i.j./10 ml + 1000 i.j./10 ml)	Baxter AG	Austrija	53,552.50	7200 i.j.	385,578.00	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066702	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	WILATE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5ml (500i.j./5ml + 500i.j./5ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H	Austrija	38,602.50	7200i.j	555,876.00	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066703	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	WILATE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10ml (1000i.j./10ml + 1000i.j./10ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H	Austrija	77,204.90	7200i.j	555,875.28	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066704	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (30 i.j. VWF/ml + 25 i.j. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	14,438.70	7200i.j	415,834.56	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066705	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j. VWF/ml + 50 i.j. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	28,877.30	7200i.j	415,833.12	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066706	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (120 i.j. VWF/ml + 100 i.j. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	57,754.60	7200i.j	415,833.12	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066707	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 15 ml (120 i.j. VWF/ml + 100 i.j. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	86,631.90	7200i.j	415,833.12	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066602	B02BD08	eptakog alfa (aktivirani)	NOVOSEVEN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	72,679.70	2500000 i.j.	3,633,985.00	-	Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0066000	B02BD06	eptakog alfa (aktivirani)	NOVOSEVEN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/1ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	72,679.70	2500000 i.j.	3,633,985.00	-	Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0066070	B02BX01	etamsilat	DICYNONE	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (250 mg/ 2 ml)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	1,182.10	-	-	-		
1066072	B02BX01	etamsilat	DICYNONE	tableta	blister, 30 po 250 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	1,052.20	-	-	-		
0060250	B03AC..	gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks	FERROVIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Rafarm S.A.	Grčka	3,218.80	0,1 g	643.76	-		ŠTAC
0060251	B03AC02	gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks	FERRUM Sandoz	koncentrat za rastvor za infuziju	5 po 5ml (100mg/5ml)	Salutas Pharma GMBH	Nemačka	3,218.80	0,1 g	643.76	-		ŠTAC
0051550	B03BA03	hidroksokobalamin	OHB 12	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	384.60	20 mcg	0.62	-		
0179315	B05AA01	albumin, humani	HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml, 200g/L	Baxter AG	Austrija	3,644.80	-	-	-		ŠTAC
0179323	B05AA01	albumin, humani	UMAN ALBUMIN	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (200g/L)	Kedrion S.P.A.	Italija	3,644.80	-	-	-		ŠTAC
0179045	B05AA01	albumin, humani	LJUDSKI ALBUMIN 20%	rastvor za infuziju	1 po 10 ml 20%	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	776.80	-	-	-		ŠTAC
0179048	B05AA01	albumin, humani	LJUDSKI ALBUMIN 20%	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (20%)	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	3,884.80	-	-	-		ŠTAC
0179190	B05AA01	albumin	HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (20%)	CSL Behring GmbH	Nemačka	3,644.80	-	-	-		ŠTAC
0179360	B05AA01	albumin, humani	ALBIOMIN 20%	rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	3,644.80	-	-	-		ŠTAC
0179188	B05AA01	albumin, humani	FLEXBUMIN 20%	rastvor za infuziju	kesa, 24 po 50 ml (20%)	Baxter AG	Austrija	87,474.80	-	-	-		ŠTAC
0179187	B05AA01	albumin, humani	FLEXBUMIN 20%	rastvor za infuziju	kesa, 12 po 100 ml (20%)	Baxter AG	Austrija	87,474.80	-	-	-		ŠTAC
0179003	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50ml (200g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	3,644.80	-	-	-		ŠTAC
0179004	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100ml (200g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	7,289.60	-	-	-		ŠTAC
0179001	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	1,943.00	-	-	-		ŠTAC
0179002	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	4,124.70	-	-	-		ŠTAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0179000	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AS; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	9,685.60	-	-	-		STAC
0179551	B05AA01	albumin, humani	ALBUTEIN 20%	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	3,644.80	-	-	-		STAC
0179552	B05AA01	albumin, humani	ALBUTEIN 20%	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	7,289.60	-	-	-		STAC
0013454	B05AA01	albumin, humani	UMAN ALBUMIN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)	Kedrion S.P.A.	Italija	3,644.80	-	-	-		STAC
0013453	B05AA01	albumin, humani	UMAN ALBUMIN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)	Kedrion S.P.A.	Italija	7,289.60	-	-	-		STAC
0179345	B05AA07	hidroksietiliskrob, natrijum hlorid	HETASORB 6%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	692.20	-	-	-		STAC
0179355	B05AA07	hidroksietiliskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina	TETRASPAN 6%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,286 g/l + 671 mg/l)	B.Braun Medical SA	Švajcarska	6,867.80	-	-	-		STAC
0174030	B05BA01	alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin	HEPASOL 8%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/l + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,58 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,06 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	590.70	-	-	-		STAC
0174041	B05BA01	alanin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin	VAMINOLACT	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (6.3g/l+4.1g/l+4.1g/l+ 1g/l +7.1g/l+2.1g/l+2.1g/l+3.1 g/l+7g/l+5.6g/l+1.3g/l+2.7 g/l+5.6g/l+3.8g/l+300mg/l +3.6g/l+1.4g/l+500mg/l+ 3.6g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	11,509.90	-	-	-		STAC
0174036	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan	AMINOSOL 15%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	640.00	-	-	-		STAC
0174035	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan	AMINOSOL 10%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml	Hemomont d.o.o.	Crna Gora	422.60	-	-	-		STAC
0174021	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan	AMINOVEN 10%	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	4,226.00	-	-	-		STAC
0174023	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan	AMINOVEN 15%	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	6,400.00	-	-	-		STAC
0171110	B05BA02	sojino ulje, glicerol, lecitin jajeta	LIPOVENOES 10% PLR	emulzija za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (10%+2,5%+0,6%)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	7,746.10	-	-	-		STAC
0171291	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kesa, 10 po 100 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	5,104.20	-	-	-		STAC
0171287	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kesa, 1 po 250 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	1,031.30	-	-	-		STAC
0171289	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kesa, 1 po 500 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	1,364.60	-	-	-		STAC
0171310	B05BA02	ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	emulzija za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (100 g/l + 100 g/l)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	4,898.10	-	-	-		STAC
0171312	B05BA02	ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	emulzija za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (100 g/l + 100 g/l)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	13,386.20	-	-	-		STAC
0171297	B05BA02	prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 100ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	4,898.30	-	-	-		STAC
0171298	B05BA02	prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 250ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	6,758.80	-	-	-		STAC
0171299	B05BA02	prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 500ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	13,386.70	-	-	-		STAC
0173220	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (5%)	Hemofarm a.d	Republika Srbija	66.50	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0173225	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	62.50	-	-	-		
0173306	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (50 g/l)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,201.80	-	-	-		
0173305	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500ml (50 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemačka; Španija; Rumunija	664.90	-	-	-		
0173307	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000ml (50 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,350.30	-	-	-		
0173300	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 x 500ml (100g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemačka; Španija; Rumunija	825.00	-	-	-		
0173301	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000ml (100g/L)	B.Braun Melsungen AG ; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,633.10	-	-	-		
0173900	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESENIUS	rastvor za infuziju	boca staklena, 49 po 100 ml (5%)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	2,944.30	-	-	-		
0173901	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESENIUS	rastvor za infuziju	boca staklena, 20 po 500 ml (5%)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	1,330.00	-	-	-		
0171300	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	5 po 1026 ml (900 kcal)	Fresenius Kabi	Austrija	10,470.20	-	-	-		STAC
0171301	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, asparaginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	4 po 1540 ml (1400 kcal)	Fresenius Kabi	Austrija	11,476.60	-	-	-		STAC
0171306	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	3 po 2566 ml (2300 kcal)	Fresenius Kabi	Švedska	17,290.50	-	-	-		STAC
0171303	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	4 po 1440 ml (1000 kcal)	Fresenius Kabi	Austrija	11,371.20	-	-	-		STAC
0171305	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	3 po 2400 ml (1700 kcal)	Fresenius Kabi	Švedska	12,063.00	-	-	-		STAC
0171121	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N4-550E	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,38g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)	Baxter S.A.	Belgija	13,722.40	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171123	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N7-1000E	emulzija za infuziju	kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	Baxter S.A.	Belgija	15,978.70	-	-	-		STAC
0171124	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N7-1000E	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	Baxter S.A.	Belgija	15,861.70	-	-	-		STAC
0174203	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksid, kalijum-acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat	AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (5g/l, 5,9g/l, 6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 5,2g/l, 11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l, 12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l, 2,858g/l, 0,36g/l, 2,453g/l, 0,508g/l, 3,581g/l	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	7,521.00	-	-	-		STAC
0171320	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, triglicerid, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PERI	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,806 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,84 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	13,744.70	-	-	-		STAC
0171321	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, triglicerid, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PERI	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,806 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,84 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	16,061.30	-	-	-		STAC
0171322	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, triglicerid, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PERI	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 2500 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,806 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,84 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	19,947.30	-	-	-		STAC
0171323	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, triglicerid, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1250 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,726 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,688 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	16,559.60	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171324	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1875 ml (2,256 g/l + 3,006 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,685 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	19,298.40	-	-	-		STAC
0171325	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 2500 ml (2,256 g/l + 3,006 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,685 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	25,070.30	-	-	-		STAC
0174205	B05BA10	glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFKABIVEN	emulzija za infuziju	kesa, 3 po 2463ml (2700kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi AB	Švedska	15,821.00	-	-	-		STAC
0174201	B05BA10	glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFKABIVEN	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 1477ml (1600kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi AB;Fresenius Kabi Austrija GmBH	Svedska; Austrija	14,522.10	-	-	-		STAC
0171346	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, ribljе ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFKABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	kese, 4 po 1206ml (800kcal) (130g/L+14g/L+12g/L+11 g/L+3g/L+5g/L+7.4g/L+6. 6g/L+4.3g/L+5.1g/L+11.2 g/L+6.5g/L+1g/L+4.4g/L+ 2g/L+0.4g/L+6.2g/L+0.56 g/L+4.18g/L+1.2g/L+4.48 g/L+3.4g/L+0.0129g/L+6 0g/L+60g/L+50g/L+30g/L)	Fresenius Kabi AB	Švedska	10,609.20	-	-	-		STAC
0175260	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	78.20	-	-	-		
0175315	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGEROV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (8.6 g/L+0.3 g/L+0.33 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Pharmaceutical s S.A.	Nemačka; Rumunija	782.00	-	-	-		
0175316	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGEROV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000 ml (8.6 g/L+0.3 g/L+0.33 g/L)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	1,544.90	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0175515	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	78.20	-	-	-		
0175331	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGEROV RASTVOR	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	78.20	-	-	-		
0175185	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	77.20	-	-	-		
0175420	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR BAXTER	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija, Velika Britanija; Belgija	77.20	-	-	-		
0175320	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6,24 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemačka; Španija; Rumunija	772.00	-	-	-		
0175321	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6,24 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,234.50	-	-	-		
0175322	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.Braun	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 50ml (9g/L)	B.Braun Melsungen AG;B.Braun Medical SA; S.C B. Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemačka, Španija; Rumunija	1,377.20	-	-	-		
0175312	B05BB01	natrijum hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (9g/l)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA	Nemačka; Rumunija; Španija	1,152.00	-	-	-		
0175585	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 250mL (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	524.00	-	-	-		
0175310	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca, plastična, 10 po 500mL (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A	Nemačka; Španija; Rumunija	711.50	-	-	-		
0175311	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000mL (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A	Nemačka; Španija; Rumunija	1,446.20	-	-	-		
0400430	B05BC01	manitol	MANITOL HF 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml 20%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	323.70	-	-	-		
0400431	B05BC01	manitol	MANITOL HF 10%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml 10%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	349.60	-	-	-		
9175213	B05CX10	manitol, sorbitol	ISPIROL	rastvor za ispiranje bešike	kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,401.10	-	-	-		
9175730	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850.10	-	-	-		
9175731	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2500 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	978.60	-	-	-		
9175732	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 5000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,356.30	-	-	-		
9175733	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850.10	-	-	-		
9175734	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2500 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	978.60	-	-	-		
9175735	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 5000 ml (2.27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,356.30	-	-	-		
9175736	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l +0.184g/l+0.051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850.10	-	-	-		
9175737	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2500 ml (3,86% m/v + (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l +0.184g/l+0.051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	978.60	-	-	-		
9175738	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 5000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l +0.184g/l+0.051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,356.30	-	-	-		
9175741	B05DA...	ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	EXTRANEAL	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (7,5% (75g/l)+5.4g/l+4.5g/l+0.257g/l+0.051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	2,386.80	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9175739	B05DB..	tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid	NUTRINEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (0.3g/l+0.27g/l+0.57g/l+0.846g/l+0.51g/l+0.599g/l+0.51g/l+0.951g/l+1.393g/l+0.85g/l+0.85g/l+1.02g/l+0.955g/l+0.714g/l+1.071g/l+0.184g/l+0.051g/l+4.48g/l+5.38g/l	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,589.40	-	-	-		
9175716	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,161.10	-	-	-		
9175717	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,161.10	-	-	-		
9175718	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 4.25% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42,5 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,161.10	-	-	-		
9175743	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,161.10	-	-	-		
9175744	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,161.10	-	-	-		
9175745	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 4.25% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,161.10	-	-	-		
9175702	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+42.5g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmBh	Nemačka	3,413.40	-	-	-		
9175701	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmBh	Nemačka	3,413.40	-	-	-		
9175700	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmBh	Nemačka	3,413.40	-	-	-		
9175705	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+42,5g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,413.40	-	-	-		
9175704	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+22,73g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,413.40	-	-	-		
9175703	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+15g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,413.40	-	-	-		
9175760	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850.10	-	-	-		
9175762	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973.90	-	-	-		
9175761	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973.90	-	-	-		
9175765	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973.90	-	-	-		
9175763	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850.10	-	-	-		
9175764	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973.90	-	-	-		
9175766	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% m/v /38,6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (38,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850.10	-	-	-		
0175150	B05XA01	kalijum hlorid	KALIUM CHLORID FRESENIUS	koncentrat za rastvor za infuziju	20 po 20 ml (1 mmol/ml)	Fresenius Kabi Norge AS	Norveška	896.10	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0175333	B05XA01	kalijum-hlorid	KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula Mini-plasco Connect, 20 po 20 ml	B.Braun Melsungen	Nemačka	696.10	-	-	-		
0175335	B05XA01	kalijum-hlorid	KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN	koncentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 20 po 100 ml	B.Braun Melsungen	Nemačka	3,144.60	-	-	-		
0133110	B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat	NATRIUMBICARBONAT "FRESENIUS" 8,4%	koncentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (8,4%)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	3,896.70	-	-	-		
0175240	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml 0,9%	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	71.20	-	-	-		
0175582	B05XA03	natrijum hlorid	SODIUM CHLORIDE	rastvor za infuziju	boca staklena, 49 po 100 ml (9g/l)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	2,822.30	-	-	-		
0175561	B05XA03	natrijum hlorid	SODIUM CHLORIDE	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (9g/l)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	71.20	-	-	-		
0170350	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0.9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska	57.60	-	-	-		
0175351	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0.9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska	52.40	-	-	-		
0175352	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0.9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska	71.20	-	-	-		
0174050	B05XB02	alanil- glutamin	DIPEPTIVEN	koncentrat za rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	36,129.40	-	-	-		STAC
0052720	B05XC..	tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoksin, pantotenska kiselina, askorbinska kiselina, biotin, folna kiselina, cijanokobalamin	SOLUViT N	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 10 ml (2,5mg+3,6mg+40mg+4mg+15mg+100mg+60mcg+0,4mg+5mcg)	Fresenius Kabi AB	Švedska	3,535.70	-	-	-		STAC
0100255	C01AA05	digoksin	DIGOXIN SOPHARMA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (0,25mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	511.10	0,25 mg	25.56	-		
0101355	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	421.30	0,2 g	93.62	-		
0105001	C01CA03	norepinefrin	NORADRENALIN MEDIKUNION	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 100 po 10ml (1mg/ml)	Laboratorios Normon S.A.	Španija	29,159.00	6 mg	349.91	-		
0105146	C01CA04	dopamin	DOPAMIN ADMEDA 50	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH	Nemačka	522.90	0,5 g	1,045.80	-		
0105401	C01CA07	dobutamin	DOBUTAMIN ADMEDA 250	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)	Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH	Nemačka	397.20	0,5 g	794.40	-		
0105000	C01CA07	dobutamin	DOBUTAMINE PANPHARMA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 20 ml (250mg/20ml)	Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk	Nemačka	3,972.00	0.5 g	794.40	-		
0102180	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerin)	NIRMIN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	4,040.90	-	-	-		
0102183	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L I.M	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)	Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A	Italija	808.20	.	-	-		
0103290	C02CA06	urapidil	EBRANTIL 25	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 25 mg/5 ml	Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH	Nemačka, Austrija	970.70	50 mg	388.28	-		STAC
0103291	C02CA06	urapidil	EBRANTIL 50	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 50 mg/10 ml	Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH	Nemačka; Austrija	910.20	50 mg	182.04	-		STAC
0103293	C02CA06	urapidil	URAPIDIL 25 mg i.v. CARINO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (25mg/5ml)	Haupt Pharma Wulfing GmbH	Nemačka	970.70	50 mg	388.28	-		STAC
0103294	C02CA06	urapidil	URAPIDIL 50 mg i.v. CARINO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (50mg/10ml)	Haupt Pharma Wulfing GmbH	Nemačka	910.20	50 mg	182.04	-		STAC
0400411	C03CA01	furosemid	FUROSEMID SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	377.50	40 mg	75.50	-		
0400142	C03CA01	furosemid	LASIX	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 2ml (20mg/2ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Delpharm Dijon	Nemačka; Francuska	184.00	40 mg	61.33	-		
0400413	C03CA01	furosemid	EDEMID	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (20 mg/2ml)	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	188.80	40mg	75.52	-		
0400040	C03CA02	bumetanid	YURINEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (0,5 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	111.70	1 mg	22.34	-		
0107497	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	387.40	0,15 g	2,324.40	-		
0402102	C08CA06	nimodipin	NIMOTOP S	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (10mg/50 ml)	Bayer Pharma AG	Nemačka	937.40	50 mg	4,687.00	-		STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
0402666	C08CA06	nimodipin	NIMODIPIN 10 mg i.v. CARINO	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (10mg/50ml)	Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH	Nemačka	937.40	50 mg	4,687.00	-		STAC. Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
0402721	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)	Alkaloid a.d.	Makedonija	336.60	0,24 g	1,615.68	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103462	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 7,5 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	351.30	30 mg	50.19	-	1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovan u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije. 2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovan u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.	
4156150	D08AG02	povidon jod	POVIDON JOD HF	rastvor za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	389.70	-	-	-		
4156475	D08AG02	povidon	JODOKOMP	rastvor za kožu	boca plastična, 1 po 100 ml (10 %)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	93.70	-	-	-		
4156474	D08AG02	povidon	JODOKOMP	rastvor za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (10 %)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	389.70	-	-	-		
4156473	D08AG02	povidon	JODOKOMP	rastvor za kožu	kontejner plastični, 1 po 5000 ml (10%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	3,897.60	-	-	-		
4156472	D08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	boca plastična, 1 po 100 ml (7,5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	93.70	-	-	-		
4156471	D08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (7,5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	389.70	-	-	-		
4156470	D08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	kontejner plastični, 1 po 5000 ml (7,5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	3,897.60	-	-	-		
0141132	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	injekcija	50 po 0,1 mg/1 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	599.60	0,2 mg	23.98	-		
0141135	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	injekcija	50 po 0,2 mg/1 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,208.10	0,2 mg	24.16	-		
4143125	G02AD02	dinoproston (PGE2)	PREPIDIL GEL	endocervikalni gel	napunjeni injekcioni špric, 1 po 3 g (0,5 mg/3g)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1,999.10	0,5 mg	332.68	-		STAC
6143120	G02AD02	dinoproston (PGE2)	PROSTIN E2	vaginalna tableta	4 po 3 mg	Sanico N.V.	Belgija	3,532.50	0,5 mg	147.19	-		STAC
0143043	G02AD04	karboprost (PGM15)	PROSTIN 15M	rastvor za injekciju	1 po 0,25 mg/ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1,727.30	2,5 mg	17,273.00	-		STAC
0048619	G03BA03	testosteron	TESTOSTERON DEPO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,066.30	18 mg	15.35	-		
0048486	G03DA03	hidroksiprogesteron	PROGESTERON DEPO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	955.50	10 mg	7.86	-		
4137040	G03DA04	progesteron	CRINONE	vaginalni gel	8%, aplikator, 15 po 1,125 g	Central Pharma (Contract Packing) LTD	Velika Britanija	3,856.40	90 mg	257.23	-	1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97). 2. U toku invitro oplodnje (N97).	
0044066	G03GA02	menotrofin	MENOPUR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1ml rastvarača	Ferring GmbH	Nemačka	17,761.90	75 i.j.	1,776.19	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044087	G03GA02	menotrofin	MENOPUR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (600i.j)	Ferring-Leciva, A.S.	Češka	15,908.20	75 i.j.	1,988.53	-	1 Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044400	G03GA02	menotrofin	MERIONAL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1ml (75 i.j. FSH/75 i.j. LH)	IBSA Institut Biochemique S.A.	Švajcarska	1,776.20	75 i.j.	1,776.20	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044412	G03GA04	urofolitropin	FOSTIMON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)	IBSA Institut Biochemique S.A.	Švajcarska	1,246.30	75 i.j.	1,246.30	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044250	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	2,680.70	75 i.j.	2,680.70	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044251	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 300	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	11,013.50	75 i.j.	2,753.38	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044252	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 450	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	16,417.90	75 i.j.	2,736.32	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044253	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 900	rastvor za injekciju, u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	32,801.40	75 i.j.	2,733.45	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044001	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0.25 ml (150.i.j./0.25 ml)	Finox Biotech AG; Gedeon Richter PLC	Lihtenštajn; Mađarska	4,330.60	75 i.j.	2,165.30	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2 Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044002	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0.375 ml (225i.j./0.375 ml)	Finox Biotech AG; Gedeon Richter PLC	Lihtenštajn; Mađarska	6,482.80	75 i.j.	2,160.93	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044000	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0.125 ml (75 i.j./0.125 ml)	Finox Biotech AG; Gedeon Richter PLC	Lihtenštajn; Mađarska	2,144.60	75 i.j.	2,144.60	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044230	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 0,36 ml (300 i.j/0,36ml)	Organon Ireland Limited	Irska	10.872,40	75 i.j.	2,718.10	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udruženih sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044231	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 0,72 ml (600 i.j/0,72ml)	Organon Ireland Limited	Irska	22.699,20	75 i.j.	2,837.40	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udruženih sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044232	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,08 ml (900 i.j/1,08ml)	Organon Ireland Limited	Irska	32.390,80	75 i.j.	2,699.23	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udruženih sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044270	G03GA08	horiogonadotropin alfa	OVITRELLE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric 1 po 0.5 ml (250mcg/0,5ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	2,895.10	0,25mg	2,895.10	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044269	G03GA08	horiogonadotropin alfa	OVITRELLE	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0.5 ml (250 mcg/0.5ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	2,895.10	0,25mg	2,895.10	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044405	G03GA09	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 150mcg/0.5ml	N.V Organon	Holandija	52,529.10	0,15mg	52,529.10	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044406	G03GA09	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u napunjenom injokcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 100mcg/0.5ml	N.V Organon	Holandija	48,028.80	0,15mg	72,043.20	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044256	G03GA30	folitropin alfa, lutropin alfa	PERGOVERIS	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1ml (150i.j./1ml+75i.j./1ml)	Merck Serono S.A.; Merck Serono S.P.A.	Švajcarska; Italija	8,196.80	1 ml	8,196.80	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0140150	H01BB02	oksitocin	OXYTOCIN SYNTHETIC	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 1 ml (10 i.j./ml)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	3,710.60	15 i.j.	55.66	-		STAC
0049190	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	1,765.60	0,7 mg	2,471.84	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0); 3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0); 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).	Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049195	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	55,917.10	0,7 mg	3,914.20	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049196	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 20 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	96,385.30	0,7 mg	3,373.49	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049197	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 30 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	125,243.80	0,7 mg	2,922.36	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049191	H01CB02	oktreotid	OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA L.I.M.	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1 ml (0,1mg/ml)	Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.	Italija	3,531.20	0,7 mg	2,471.84	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0); 3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0); 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).	Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049231	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric,1 po 60 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	78,912.50	3 mg	3,945.63	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049232	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric,1 po 90 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	85,171.40	3 mg	2,839.05	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049233	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric,1 po 120 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	115,757.90	3 mg	2,893.95	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049220	H01CC01	ganireliks	ORGALUTRAN	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5ml (0.25mg/0.5ml)	Organon Ireland Limited	Irska	3,423.70	0,25mg	3,423.70	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044260	H01CC02	cetroreliks	CETROTIDE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (0,25mg/ml)	Merck KgaA	Nemačka	3,893.80	0,25mg	3,893.80	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
0047286	H02AB01	betametazon	DIPROPHOS	suspenzija za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (7 mg/ml)	Schering-Plough Labo NV	Belgija	1,458.30	0,4 mg	16.67	-		
0047140	H02AB02	deksametazon	DEXASON	rastvor za injekciju	ampula, 25 po 1 ml (4 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,111.60	1,5 mg	16.67	-		
0047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	rastvor za injekciju	ampula, 3 po 2 ml (8mg/2ml)	Merck KGaA	Nemačka	264.50	1,5 mg	16.53	-		
0047220	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,5 ml (500 mg/7,8 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	670.50	20 mg	26.82	-		
0047218	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,518.90	20 mg	50.63	-		
0047212	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD DEPO	suspenzija za injekciju	bočica. 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	980.60	20 mg	49.03	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0050141	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	1,181.90	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to. terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatiranim bubregom i sekundarnim hiperparatireoidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekuretnim sekundarnim hiperparatireoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0050143	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	5,909.50	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to. terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatiranim bubregom i sekundarnim hiperparatireoidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekuretnim sekundarnim hiperparatireoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0050142	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	1,181.90	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to. terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatiranim bubregom i sekundarnim hiperparatireoidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekuretnim sekundarnim hiperparatireoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0050144	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	rastvor za injekciju	bočica, 5 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	5,909.50	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to. terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatiranim bubregom i sekundarnim hiperparatireoidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekuretnim sekundarnim hiperparatireoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
1050014	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	kapsula, meka	blister, 28 po 1 mcg	Rafarm SA; GAP SA	Grčka, Grčka	5,302.00	2 mcg	378.71	-	Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to. terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatiranim bubregom i sekundarnim hiperparatireoidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekuretnim sekundarnim hiperparatireoidizmom nakon operativnog lečenja Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
1050017	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	kapsula, meka	blister, 28 po 2 mcg	Rafarm SA; GAP SA	Grčka; Grčka	10,603.90	2 mcg	378.71	-	Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to. terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatiranim bubregom i sekundarnim hiperparatireoidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekuretnim sekundarnim hiperparatireoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0029781	J01AA12	tigeciklin	TYGACIL	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 10 po 50 mg	Wyeth Pharmaceuticals; Wyeth Lederle S.r.l.	Velika Britanija; Italija	54,349.60	0,1 g	10,869.92	-		**
0021106	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	397.60	2 g	79.52	-		
0021109	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	3,975.50	2 g	79.51	-		
0021940	J01CA01	ampicilin	AMPICILLIN ATB 1000 mg	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 100 po 1000 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	3,975.50	2 g	79.51	-		
0020017	J01CE01	benzilpenicilin	PAN-PENI G SODIUM	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 50 po 0,6 g (1.000.000 i)	Panpharma	Francuska	3,751.90	3,6 g	450.23	-		
0020056	J01CE30	benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin	PANCILLIN	prašak za suspenziju za injekciju	bočica, 50 po 600000 i.j. (600000i.j.+ 200000i.j.)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2,541.60	6000000 i.j.	508.32	-		
0021565	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	5 po (1000 mg+ 200 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	934.50	3 g	560.70	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0021650	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	MEDOCLAV	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1,2 g (1000 mg+ 200 mg)	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	934.50	3 g	560.70	-		ŠTAC
0021651	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOXIPLUS 1.2g	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1,2g (1000mg +200mg)	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	9,344.80	3g	560.69	-		ŠTAC
0021995	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	PIPTAZ	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 12 po 4,5 g (4 g + 0.5g)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,557.20	14 g	1,620.85	-		**
0021996	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	TAZOCIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 12 po 4,5 g (4g + 0,5g)	Wyeth Lederle S.R.L.	Italija	5,557.20	14 g	1,620.85	-		**
0321961	J01DB04	cefazolin	GALECEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 50 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	5,154.00	3 g	309.24	-		
0321962	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1g	Galenika a.d.	Republika Srbija	5,154.00	3 g	309.24	-		
0321030	J01DB04	cefazolin	PRIMACEPH	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	5,154.00	3 g	309.24	-		
0321829	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 2 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,601.80	3 g	240.27	-		
0321654	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN PHARMANOVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 1 g	PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP"	Ukrajina	515.40	3 g	309.24	-		
0321027	J01DC02	cefuroksim	ZINACEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena,1 po 750 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	90.40	3 g	361.60	-		
0321026	J01DC02	cefuroksim	ZINACEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena,1 po 1500 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	139.00	3 g	278.00	-		
0321025	J01DC02	cefuroksim	CEFUROKSIM	prašak za rastvor za injekciju /infuziju	bočica staklena, 1 po 1500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	139.00	3 g	278.00	-		
0321024	J01DC02	cefuroksim	CEFUROKSIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 750 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	90.40	3 g	361.60	-		
0321404	J01DC02	cefuroksim	DICEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	6,949.50	3 g	277.98	-		
0321682	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Chephasaar Chem Pharm.	Nemačka	903.80	3 g	361.52	-		
0321683	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,389.90	3 g	277.98	-		
0321684	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg/100 ml	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,389.90	3 g	277.98	-		
0321955	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	903.80	3 g	361.52	-		
0321874	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	1,389.90	3 g	277.98	-		
0321666	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIME	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	903.80	3 g	361.52	-		
0321667	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIME	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	1,389.90	3 g	277.98	-		
0321983	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	1,726.00	4 g	690.40	-		ŠTAC
0321984	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	17,260.00	4 g	690.40	-		ŠTAC
0321977	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Chephasaar Chem - Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	1,726.00	4 g	690.40	-		ŠTAC
0321976	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2 g	Chephasaar Chem - Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	3,836.50	4 g	767.30	-		ŠTAC
0321600	J01DD02	ceftazidim	FORCAS	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	311.70	4 g	1,246.80	-		ŠTAC
0321601	J01DD02	ceftazidim	FORCAS	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 500 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	165.30	4 g	1,322.40	-		ŠTAC
0321023	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	311.70	4 g	1,246.80	-		ŠTAC
0321603	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM SANDOZ	prašak za rastvor za injekciju	1 po 500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	165.30	4 g	1,322.40	-		ŠTAC
0321602	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM SANDOZ	prašak za rastvor za injekciju	1 po 1 g	Sandoz GmbH	Austrija	311.70	4 g	1,246.80	-		ŠTAC
0321707	J01DD02	ceftazidim	TIZACEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	15,584.80	4 g	1,246.78	-		ŠTAC
0321758	J01DD04	ceftriakson	AZARAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 50 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	5,903.80	2 g	236.15	-		ŠTAC**
0321329	J01DD04	ceftriakson	LONGACEPH	prašak za rastvor za injekciju /infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,180.80	2 g	236.16	-		ŠTAC **
0321663	J01DD04	ceftriakson	LENDACIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 1 g	Sandoz GmbH	Austrija	1,180.80	2 g	236.16	-		ŠTAC **
0321997	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,180.80	2 g	236.16	-		ŠTAC **
0321999	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	4,774.60	2 g	477.46	-		ŠTAC **
0321969	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON PHARMANOVA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1 g	PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP"	Ukrajina	590.40	2 g	236.16	-		ŠTAC **
0321978	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2mL (500mg/2ml)	Mitim S.r.l	Italija	68.30	2g	273.20	-		ŠTAC **
0321979	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3.5mL (1g/3.5mL)	Mitim S.r.l	Italija	118.10	2 g	236.20	-		ŠTAC **
0321914	J01DE01	cefepim	MAXICEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena,1 po 1000 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	511.80	2 g	1,023.60	-		ŠTAC
0321630	J01DE01	cefepim	CEFIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	511.80	2 g	1,023.60	-		ŠTAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321915	J01DE01	cefepim	CEFEPIM KABI	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1 g	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	511.60	2 g	1,023.60	-		ŠTAC
0029754	J01DH02	meropenem	MEROCID	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena,10 po 1000 mg	PharmaSwiss d.c.o.	Republika Srbija	6,552.10	2 g	1,310.42	-		**
0029755	J01DH02	meropenem	ITANEM	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	3,230.80	2 g	1,292.32	-		**
0029756	J01DH02	meropenem	ITANEM	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	6,552.10	2 g	1,310.42	-		**
0029752	J01DH02	meropenem	MEROPENEM SANDOZ	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	3,230.80	2 g	1,292.32	-		**
0029764	J01DH02	meropenem	MEROPENEM SANDOZ	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	6,552.10	2 g	1,310.42	-		**
0029701	J01DH02	meropenem	ARCHIFAR	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	3,230.80	2 g	1,292.32	-		**
0029700	J01DH02	meropenem	ARCHIFAR	prasak za rastvor za injekciju/infuziju	bocica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	6,552.10	2 g	1,310.42	-		**
0029760	J01DH03	ertapenem natrijum	INVANZ	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1 g	Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret	Francuska	5,015.40	1 g	5,015.40	-		ŠTAC
0029507	J01DH51	imipenem, cilastatin	MIPECID	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)	Pharmaswiss d o.o	Republika Srbija	5,115.90	2 g	2,046.36	-		**
0026601	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM Roche	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml+80 mg/5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2,734.80	1,92 g	1,093.92	-		
0325464	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	415.10	0,5 g	415.10	-		ŠTAC
0325476	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 500 mg	Pliva Hrvatska d o.o	Hrvatska	2,075.40	0,5 g	415.08	-		ŠTAC
0326041	J01FF01	klindamicin	KLINDAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,325.50	1,8 g	795.30	-		ŠTAC
0326223	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 4 ml (600 mg/4 ml)	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	948.80	1,8 g	569.28	-		ŠTAC
0326225	J01FF01	klindamicin	CLIDACIN BA FREE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 1 po 4 ml (150mg/ml)	Vianex S.A. - Plant A'	Grčka	189.80	1,8g	569.40	-		ŠTAC
0326226	J01FF01	klindamicin	CLIDACIN BA FREE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 4 ml (150mg/ml)	Vianex S.A. - Plant A'	Grčka	948.80	1,8g	569.28	-		ŠTAC
7024615	J01GB01	tobramicin	BRAMITOB	rastvor za raspršivanje	kontejner jednodozni, 56 po 4 ml (300mg/4ml)	Genetic S.P.A.; Chiesi Farmaceutici SPA	Italija; Italija	205,956.50	0.3g	3,677.79	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0024552	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (60 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	397.30	0,24 g	119.19	-		
0024553	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	596.00	0,24 g	119.20	-		
0024580	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN HF	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (60 mg/2 ml)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	397.30	0,24 g	119.19	-		
0024582	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN HF	rastvor za injekciju	10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	596.00	0,24 g	119.20	-		
0024604	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN B. BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 80 ml (3 mg/ml)	B.Braun Medical S.A	Španija	6,105.50	240 mg	305.28	-		ŠTAC
0024605	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN B. BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 120ml (3 mg/ml)	B.Braun Medical S.A	Španija	7,430.00	240 mg	247.67	-		ŠTAC
0024333	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1ml (40mg/ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	139.70	0.24g	83.82	-		
0024332	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2ml (80mg/2ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	397.30	0.24g	119.19	-		
0024331	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1,5 ml (120mg/1,5ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	596.00	0.24g	119.20	-		
0024282	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 100 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	629.40	1 g	629.40	-		ŠTAC
0024283	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 500 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,806.10	1 g	361.62	-		ŠTAC
0024633	J01GB06	amikacin	AMINOCIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 50 po 2 ml (500 mg/2 ml)	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	9,040.50	1 g	361.62	-		ŠTAC
0329412	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 100 mg/10 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	987.00	0,5 g	987.00	-		ŠTAC
0329403	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	987.00	0,5 g	987.00	-		ŠTAC
0329001	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)	S.C. Infomed Fluids S.R.L.	Rumunija	4,386.40	0,5 g	1,096.60	-		ŠTAC
0329004	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 200 ml (2 mg/ml)	S.C. Infomed Fluids S.R.L.	Rumunija	8,772.80	0,5 g	1,096.58	-		ŠTAC
0329081	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	10,515.40	0,5 g	1,051.54	-		ŠTAC
0329200	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID	rastvor za infuziju	bočica, 10 po 100 ml (5 mg/ml)	Alvogen Pharma d.o.o.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka; Grčka	10,515.40	0,5 g	1,051.54	-		ŠTAC
0329070	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100ml (5mg/ml)	Krka tovarna Zdravil d.d.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A;	Slovenija; Grčka; Grčka;	1,051.50	0.5g	1,051.50	-		ŠTAC
0329201	J01MA12	levofloksacin	LEVOFLOXACIN INVENTA	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 100 ml (500 mg/100ml)	Cooper S.A.	Grčka	1,051.50	0,5 g	1,051.50	-		ŠTAC
0326501	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	rastvor za infuziju	boca, 1 po 250ml (400mg/250ml)	Hemofarm A.D	Republika Srbija	946.40	0,4g	946.40	-		ŠTAC
0329502	J01MA14	moksifloksacin	MOKSIFLOKSACIN PHARMAS	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	946.40	0,4 g	946.40	-		ŠTAC
0329006	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)	Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	946.40	0,4 g	946.40	-		ŠTAC
0026790	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN-MIP	prasak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 500 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,194.00	2 g	955.20	-		**

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0029791	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN-MIP	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 1000 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	2,924.50	2 g	1,169.80	-		**
0029795	J01XA01	vankomicin	EDICIN	injekcija	1 po 500 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	238.80	2 g	955.20	-		**
0029796	J01XA01	vankomicin	EDICIN	injekcija	1 po 1 g	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	584.90	2 g	1,169.80	-		**
0029801	J01XA01	vankomicin	VOXIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena,1 po 500 mg	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	238.80	2 g	955.20	-		**
0029797	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN RIEMSER	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 1000 mg	Riemser Arzneimittel AG	Nemačka	2,924.50	2 g	1,169.80	-		**
0029796	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN RIEMSER	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 500 mg	Riemser Arzneimittel AG	Nemačka	1,194.00	2 g	955.20	-		**
0029001	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCINE ALVOGEN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Xellia Pharmaceuticals Aps	Danska	238.80	2 g	955.20	-		**
0029000	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCINE ALVOGEN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Xellia Pharmaceuticals Aps	Danska	584.90	2 g	1,169.80	-		**
0029802	J01XA01	vankomicin	VOXIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1g	Vianex S.A	Grčka	584.90	2g	1,169.80	-		**
0029760	J01XA02	teikoplanin	TARGOCID	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)	Sanofi S.P.A.	Italija	2,073.70	0,4 g	4,147.40	-		**
0029761	J01XA02	teikoplanin	TARGOCID	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)	Sanofi S.P.A.	Italija	3,930.50	0,4 g	3,930.50	-		**
0029787	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN Alvogen	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	10 po 1000000ij	Alvogen Pharma d.o.o. Xellia Pharmaceuticals APS	Republika Srbija; Danska	7,090.00	9000000ij	6,381.00	-		**
7029759	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLOBREATHE	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 1662500 i.j	Forest-Tosara Ltd.; Penn Pharmaceutical Services Limited	Irska, Velika Britanija	100,587.50	3000000 i.j.	3,241.27	-	Lečenje hroničnе plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0029061	J01XD01	metronidazol	ORVAGIL	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (500 mg/100 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	137.20	1,5 g	411.60	-		ŠTAC
0029784	J01XD01	metronidazol	METRONIDAZOLE B. BRAUN	boca plastična, rastvor za infuziju	20 po 100 ml (500 mg/100 ml)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	2,744.00	1,5 g	411.60	-		ŠTAC
0029785	J01XD01	metronidazol	METRONIDAZOL	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 100 ml (500mg/100ml)	S.M. Farmaceutici S.R.L.	Italija	1,372.00	1,5 g	411.60	-		ŠTAC
1029050	J01XX08	linezolid	ZENIX	film tableta	blister, 10 po 600 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	25,972.10	1,2 g	5,194.42	-		**
0029060	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d	Republika Srbija	938.10	1,2 g	5,628.60	-		**
0029061	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2,532.60	1,2 g	5,065.20	-		**
1029052	J01XX08	linezolid	ZYVOXID	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 10 po 600 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH	Nemačka	25,972.10	1,2 g	5,194.42	-		**
0029063	J01XX08	linezolid	ZYVOXID	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 300ml (2mg/ml)	Fresenius Kabi Norge AS	Norveška	25,326.00	1,2 g	5,065.20	-		**
0327494	J02AA01	amfotericin B	AMBISOME	prašak za koncentrat za disperziju za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 mg	Gilead Sciences INC.; Gilead Sciences Ireland UC	SAD, Irska	159,605.20	35 mg	11,172.36	-		**, ŠTAC
0327312	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	rastvor za infuziju	1 po 100 ml (2 mg/ml)	Pfizer PGM	Francuska	552.40	0,2 g	552.40	-		ŠTAC
0327357	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	552.40	0,2 g	552.40	-		ŠTAC
0327001	J02AC01	flukonazol	FLUCONAZOLE B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, 10 po 100 ml (2mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	5,524.00	0,2 g	552.40	-		ŠTAC
0327000	J02AC01	flukonazol	FLUCONAZOLE B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, 10 po 200 ml (2mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	11,662.60	0,2 g	583.13	-		ŠTAC
0327003	J02AC01	flukonazol	DIFLUZOL	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100ml (2mg/ml)	Pharmaceutical Balkans d.o.o. Novi Bečej	Republika Srbija	552.40	0,2 g	552.40	-		ŠTAC
1327402	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 10 po 100mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	701.30	0,2 g	140.26	-		ŠTAC
1327403	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	350.70	0,2 g	140.28	-		ŠTAC
0327534	J02AC03	vorikonazol	VFEND	prašak za rastvor za infuziju	1 po 200 mg	Pfizer PGM	Francuska	5,897.90	0,4 g	11,795.80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327530	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tableta	blister, 10 po 50 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3,557.30	0,4 g	2,845.84	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327532	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	14,165.30	0,4 g	2,833.06	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327533	J02AC03	vorikonazol	ADEMOLA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	5,897.90	0,4g	11,795.80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327536	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Alvogen Pharma d.o.o; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka; Grčka	5,897.90	0.4 g	11,795.80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327551	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	film tableta	blister, 14 po 50 mg	Alvogen Pharma d.o.o, Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	4,980.20	0.4 g	2,845.83	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327552	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	film tableta	blister, 14 po 200 mg	Alvogen Pharma d.o.o; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	19,831.40	0,4 g	2,833.06	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327535	J02AC03	vorikonazol	VORIKONAZOL PLIVA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	5,897.90	0.4g	11,795.80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327553	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	film tableta	blister, 14 po 50 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen Internationa SA; Pharmaten S.A.	Republika Srbija; Grčka; Grčka	4,980.20	0.4 g	2,845.83	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327511	J02AC03	vorikonazol	VORIKONAZOL PHARMAS	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen SA; Pharmathen International SA	Grčka; Grčka; Grčka	5,897.90	0.4 g	11,795.80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
3327535	J02AC04	posakonazol	NOXAFIL	oralna suspenzija	bočica staklena, 1 po 105 ml (40mg/ml)	Schering Plough	Francuska	69,398.00	800 mg	13,218.67	-	Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata primaoca matičnih ćelija hematopoeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primaoca (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu gljivičnu infekciju (Z94).	STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0327560	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za rastvor za infuziju	1 po 50 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	29,073.00	50 mg	29,073.00	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327561	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 70 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	36,964.30	50 mg	26,403.07	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327565	J02AX04	kaspofungin	DALVOCANS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen SA	Republika Srbija, Grčka	23,073.80	50 mg	23,073.80	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327564	J02AX04	kaspofungin	DALVOCANS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 70 mg	Alvogen Pharma d.o.o., Pharmathen SA	Republika Srbija, Grčka	34,685.60	50 mg	24,775.43	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327566	J02AX04	kaspofungin	KASPOFUNGIN PHARMAS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, SL; SAG Manufacturing, S.L.U	Malta; Španija; Španija	23,073.80	50 mg	23,073.80	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327567	J02AX04	kaspofungin	KASPOFUNGIN PHARMAS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 70 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, SL; SAG Manufacturing, S.L.U	Malta; Španija; Španija	34,685.60	50 mg	24,775.43	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327562	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	22,571.50	0,1g	45,143.00	-	1. Lečenje invazivnih kandidijaza; 2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94).	Za indikaciju pod tačkom 1. **; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundardnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. Za indikaciju pod tačkom 2. STAC: Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327563	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	43.095.10	0,1g	43.095.10	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite lek se može propisati samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog. Ili na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove a za nastavak lečenja koje je u njoj započeto.
0327500	J02AX06	anidulafungin	ECALTA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100mg	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	40,047.20	0,1g	40.047.20	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0328270	J05AB01	aciklovir	ZOVIRAX	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 5 po 250 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	2,741.80	4 g	8,773.76	-		**
0328260	J05AB06	ganciklovir	CYMEVENE	prašak za rastvor za infuziju	1 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	3,458.20	0,5 g	3,458.20	-		**
1328610	J05AB14	valganciklovir	VALCYTE	film tableta	bočica, 60 po 450mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	78,642.70	900mg	2,621.42	-	Prevencija CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantirani solidni organ od CMV - pozitivnog davaoca (Z94)	STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0328650	J05AX07	enfuvirtid	FUZEON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 60 po 2 ml (90 mg/ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	166.895.00	0,18 g	5,563.17	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije pokazuju da se kombinacijo od tri antiretrovirusna loka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.
0010200	J06AA03	antiserum protiv zmijskog otrova (konjski)	VIEKVIN	rastvor za injekciju	bočica staklena,1 po 5 ml	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	7,469.80	-	-	-		
0013553	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	8,884.90	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013554	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 10ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	88,849.00	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013555	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	17,769.90	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013551	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 20ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	177.699.40	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013510	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	19,016.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013511	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	40,309.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013602	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	19,016.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013600	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	40,309.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013601	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	80,537.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013505	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	80,490.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013507	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	40,245.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013506	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	20,122.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013605	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	20,122.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013606	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	40,245.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013607	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	80,490.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013609	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)	Biotest Pharma GmBH	Nemačka	7,335.20	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013355	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	4,039.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013356	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	19,016.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013357	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	40,309.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013358	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	80,537.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013359	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 400 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	161,074.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013364	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	40,245.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013361	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	80,490.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013362	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 200 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	160,981.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013206	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	7,335.20	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013508	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	19,016.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013408	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	40,309.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013308	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočice staklena, 1 po 200ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	80,537.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013618	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IQYMUNE	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)	LFB Biomedicaments	Francuska	40,245.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013617	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IQYMUNE	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (100mg/ml)	LFB Biomedicaments	Francuska	80,490.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013520	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. M.B.H; Octapharma AB	Austrija; Švedska	7,335.20	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuce grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013447	J06BB01	anti -D (RhO) imunoglobulin, humani	IMMUNORHO	prasak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (300 mcg/2ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	4,307.80	-	-	-		STAC
0013315	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	RHESONATIV	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 2 ml (625 i.j /ml)	Octapharma AB	Švedska	5,404.30	-	-	-		STAC
0013445	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	RHOPHYLAC 300	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	5,439.00	-	-	-		STAC
0013450	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	IMMUNORHO	prasak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (300mcg/2ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	4,307.80	-	-	-		STAC
0013188	J06BB02	tetanus imunoglobulin, humani	TETAGAM P	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 1ml (250 i.j./ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	1,007.80	-	-	-		
0013434	J06BB02	tetanus imunoglobulin, humani	TETANUS GAMMA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (250 i.j./1 ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	844.50	-	-	-		
0013317	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rastvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 2 ml (50 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	7,978.70	-	-	-		
0013318	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	36,675.60	-	-	-		
0013319	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 40 ml (50 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	141,559.00	-	-	-		
0013456	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku upotrebu	VENBIG	prasak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 45 ml (50i.j./ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	141,559.00	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013455	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku upotrebu	VENBIG	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50i.j./ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	36,675.60	-	-	-		
0013451	J06BB04	hepatitis B imunoglobulin, humani	IMMUNOHBS	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 ml (180i.j./ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	8,131.90	-	-	-		
0013452	J06BB04	hepatitis B imunoglobulin, humani	IMMUNOHBS	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3 ml (540i.j./3ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	28,465.20	-	-	-		
0013252	J06BB05	rabies imunoglobulin, humani	HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (najmanje 150 i.j./ml)	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	24,10/i.j.	-	-	-		
0013289	J06BB16	palivizumab	SYNAGIS	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 0,5 ml (100mg/ml)	Abbvie S.R.L.	Italija	60,724.20	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011917	J07AG01	vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B	HIBERIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	84,123.20	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011810	J07AH08	vakcina protiv meningitisa (serotip A, C, Y i W-135), polisaharidna	MENACTRA	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 0.5mL (4mcg/0.5mL+4mcg/0.5mL+4mcg/0.5mL+4mcg/0.5mL)	Sanofi Pasteur INC.	SAD	11,995.40	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011147	J07AJ51	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, adsorbovana	ALDIPETE-T	suspenzija za injekciju	bočica, 10x5ml (30i.j. (najmanje)+40i.j. (najmanje)+4i.j. (najmanje))/0.5mL;	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	17,656.00	-	-	-		
0011935	J07AL02	pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana	PREVENAR 13	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 4,4 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 32 mcg/0,5 ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	5,317.30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011660	J07AL52	pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana	SYNFLORIX	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric 1 po 0,5 ml (1 mcg/0.5 ml + 3 mcg/0.5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0.5 ml + 1 mcg/0,5 ml	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	5,244.30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011841	J07AM01	vakcina protiv tetanusa, adsorbovana	TETAVAKSAL T	suspenzija za injekciju	10 po 0,5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	1,463.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011017	J07AM51	vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana	DITEVAKSAL-T ZA ODRASLE	suspenzija za injekciju	10 po 5 ml (najviše 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	8,954.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011831	J07AM51	vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana	DITEVAKSAL-T	suspenzija za injekciju	10 po 5 ml (najmanje 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	8,954.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011185	J07AN01	vakcina protiv tuberkuloze	BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa rastvaračem u ampuli 5 po 1 ml, 1mg/mL	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	5,281.10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011676	J07BB02	vakcina protiv gripa, trovalentna prečišćeni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2) I B	VAXIGRIP	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	1 po 0,5ml (15 mcg + 15 mcg + 15 mcg)/doza	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	534.30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011913	J07BB02	vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)	VAXIGRIP	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 20 po 0,5 ml (15 mcg/doza + 15 mcg/doza + 15 mcg/doza)	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	10,685.40	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011934	J07BB02	vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisani)	INFLUVAC	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric, 1 po 0.5ml (15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	415.30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011933	J07BB02	vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisani)	INFLUVAC	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric, 10 po 0.5ml (15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	4,152.70	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011905	J07BB02	četvorovalentna vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)	VAXIGRIP TETRA	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5 ml (15mcg/0.5ml+15mcg/0.5ml+15mcg/0.5ml+15mcg/0.5ml)	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	1,194.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije
0011940	J07BB02	vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisana)	INFLUVAC TETRA	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric, 1x0.5ml, 15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	867.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011941	J07BB02	vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisana)	INFLUVAC TETRA	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric, 10x0.5ml, 15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	8,679.10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0011910	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	ENGERIX B	suspenzija za injekciju	bočica, 100 po 1ml 20mcg/ml	GlaxoSmithKline Biologicals S.A	Belgija	79,300.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011911	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinovana	ENGERIX B	suspenzija za injekciju	bočica, 100 po 0.5 ml (10mcg/0,5ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	50,925.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011904	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 1 po 1 ml (20 mcg/ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	793.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011907	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 1 po 0.5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	508.30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011906	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bocica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	5,082.60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011905	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	7,930.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011886	J07BD52	vakcina protiv malih boginja,crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila, rubeole i parotitisa)	PRIORIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračа, 1 po 0.5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	1,024.20	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011909	J07BD52	vakcina protiv malih boginja,crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa)	PRIORIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0.5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	102,420.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011955	J07BD52	vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele	M-M-R-VAXPRO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3log$_{10}$TCID50/0,5 ml + 4,1log$_{10}$TCID50/0,5 ml + 3log$_{10}$TCID50/0,5 ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	7,584.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011895	J07BF03	vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana	IMOVAX POLIO	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric,1 po 0,5 ml (40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml)	Sanofi-Aventis ZRT.; Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi Pasteur S.A.	Mađarska; Francuska; Francuska	670.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
2011700	J07BF04	vakcina protiv dečije paralize (oralna)	DVOVALENTNA ORALNA VAKCINA PROTIV POLIOMIJELITISA, TIP 1 I 3	oralna suspenzija	bočica staklena, 10 po 2ml (najmanje 10^6 $CCID_{50}$/0,1ml+ najmanje $10^{5,9}$ $CCID_{50}$/0,1ml)	Sanofi Pasteur S.A	Francuska	35,525.50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011883	J07BG01	vakcina protiv besnila	VERORAB	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica se rastvaračem u ampuli, 5 po 0.5 ml (2,5 i.j./0,5ml)	Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Mađarska	7,106.60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011927	J07BK01	vakcina protiv varičele, živa	VARILRIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 0.5 ml (10exp3.3PFU/0.5ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	3,429.60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011925	J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana	INFANRIX-IPV+Hib	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju	napunjen injekcioni špric i bočica, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml i 20-40 mcg T/0,5 ml	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	2,182.10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011929	J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)	PENTAXIM	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sa dodatkom jedne ili dve igle	bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)	Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Mađarska	2,201.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0031500	L01AA01	ciklofosfamid	ENDOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	441.40	-	-	-		
0031501	L01AA01	ciklofosfamid	ENDOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	802.30	-	-	-		
0031171	L01AA03	melfalan	MELPHALAN INNVENTA	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 mg)	Eriochem S.A.	Argentina	32,218.00	-	-	-		
0031051	L01AA06	ifosfamid	HOLOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	2,541.50	-	-	-		
1031430	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica, 5 po 5 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	1,108.30	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT se kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1031431	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica, 5 po 20 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	3,096.00	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
1031432	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica, 5 po 100 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	15,316.80	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
1031433	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica, 5 po 250 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	30,136.40	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica
0039031	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	5,242.70	-	-	-		
0039030	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	8,826.20	-	-	-		
0039032	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 100 mg	Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.	Nemačka	10,051.50	-	-	-		
0039033	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 200 mg	Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.	Nemačka	20,103.10	-	-	-		
0034180	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE PFIZER	rastvor za injekciju	bočica plastična, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Pfizer (Perth) PTY,Limited	Australija	1,869.10	-	-	-		
0034181	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE PFIZER	rastvor za injekciju	bočica plastična, 1 po 20 ml (500 mg/20 ml)	Pfizer (Perth) PTY,Limited	Australija	2,637.20	-	-	-		
0034151	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml, 15 mg/1,5 ml	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	947.40	-	-	-		
0034153	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml, 20 mg/2 ml	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	1,002.70	-	-	-		
0034154	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 2,5 ml, 25 mg/2,5 ml	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	1,230.60	-	-	-		
0034339	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injeksioni špric 1 po 0,375ml (7,5mg/0,375ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	402.00	-	-	-		
0034340	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injeksioni špric 1 po 0,5ml (10mg/0,5ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	519.40	-	-	-		
0034341	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injeksioni špric 1 po 0,0625ml (12,5mg/0,625ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	563.10	-	-	-		
0034338	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injeksioni špric 1 po 0,75ml (15mg/0.75ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	947.40	-	-	-		
0034332	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injeksioni špric 1 po 1ml (20mg/1ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	1,002.70	-	-	-		
0034025	L01BB04	kladribin	LITAK	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 10 mg/5 ml	Lipomed AG	Švajcarska	155,784.50	-	-	-		STAC
0034800	L01BB05	fludarabin	FLUDARABINE PLIVA	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml)	Pharmachemie B.V; Plivo Hrvatska d.o.o.	Holandija; Hrvatska	3,840.20	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034019	L01BB05	fludarabin	FLUDARABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	3,840.20	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečije interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034140	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli,1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	359.20	-	-	-		
0034141	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli,1 po 10 ml (500 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	1,261.70	-	-	-		
0034142	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica,1 po 1000 mg	Actavis Italy S.P.A.	Italija	2,239.60	-	-	-		
0034350	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena,1 po 100 mg/5 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	227.30	-	-	-		
0034351	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena,1 po 500 mg/10 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,132.10	-	-	-		
0034352	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena,1 po 1000 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,896.30	-	-	-		
0034023	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL - TEVA	rastvor za injekciju	bočice, 1 po 5 ml (50 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company	Holandija; Mađarska	325.30	-	-	-		
0034024	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL - TEVA	rastvor za injekciju	bočica,1 po 10 ml (50 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company	Holandija; Mađarska	263.10	-	-	-		
0034165	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	421.30	-	-	-		
0034167	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	548.20	-	-	-		
0034166	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	1,784.50	-	-	-		
0034326	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (250mg/5ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	448.30	-	-	-		
0034327	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (500mg/10ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	422.70	-	-	-		
0034328	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (1000mg/20ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	549.60	-	-	-		
0034329	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (5000mg/100ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,785.90	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034426	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	528.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika zo pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademije; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tackom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledecih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034425	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg/100 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2,496.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine. - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tackom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledecih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034551	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Vianex S.A.- Plant C	Grčka	528.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika zo pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademije; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tackom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledecih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034550	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Vianex S.A.- Plant C	Grčka	2,496.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine. - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034432	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 5 ml (40mg/ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	528.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika zo pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademije; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tackom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledecih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034431	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 25 ml (40mg/ml)	Ebewe Pharma Ges M.B.H NFG. KG	Austrija	2,496.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine. - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034429	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 50 ml (40mg/ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	5,356.80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika zo pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademije; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tackom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledecih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034008	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	528.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine. - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034007	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	2,498.30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika zo pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademije; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tackom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija: Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034006	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2000 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	5,356.80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plucne bolesti Vojvodine. - Klinika za plućne bolesti „ Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034445	L01BC06	kapecitabin	XALVOBIN	film tableta	blister, 120 po 500 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Remedica Ltd	Republika Srbija; Kipar	9,872.70	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u klinickom stadijumu Dukes "C" , PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1034450	L01BC06	kapecitabin	ECANSYA	film tablete	120 po 500 mg	Pharmacare premium LTD,Malta; Krka, tovarna zdravil d.d, Slovenija	Malta; Slovenija	9,872.70	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina ili/i taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034343	L01BC06	kapecitabin	CAPECITABINE PHARMASWISS	film tablete	120 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	9,872.70	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina ili/i taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034443	L01BC06	kapecitabin	KAPETRAL	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1,622.00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina ili/i taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034442	L01BC06	kapecitabin	KAPETRAL	film tableta	blister, 120 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	9,872.70	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina ili/i taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0030040	L01CA02	vinkristin	VINCRISTINE PFIZER	rastvor za injekciju/infuziju	bočica plastična, 5 po 1 ml (1mg/ml)	Pfizer (Perth) PTY.Limited	Australija	3,111.10	-	-	-		
0030240	L01CA04	vinorelbin	VINORELSIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1 ml (10 mg/ml)	Actavis Italy S.P.A; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	1,440.90	-	-	-		
0030241	L01CA04	vinorelbin	VINORELSIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Actavis Italy S.P.A; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	6,484.30	-	-	-		
0030243	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,440.90	-	-	-		
0030242	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	6,484.30	-	-	-		
0030111	L01CB01	etopozid	ETOPOSID "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena,1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	679.00	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0030121	L01CB01	etopozid	ETOPOSIDE-TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	679.00	-	-	-		
0030122	L01CB01	etopozid	SINTOPOZID	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	679.00	-	-	-		
0039350	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebewe	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2,627.10	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina. PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguca neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039351	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebewe	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	8,318.90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguca neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039500	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL - TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica,1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	2,627.10	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguca neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039501	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL - TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 16,7 ml (100 mg/16,7 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	8,318.90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039020	L01CD01	paklitaksel	SINDAXEL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (30 mg/ 5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	2,627.10	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039021	L01CD01	paklitaksel	SINDAXEL	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 16,67 ml (100 mg/16,67 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	8,318.90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039858	L01CD01	paklitaksel	SINDAXEL`	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 25ml (150mg/25ml)	Actavis Italy S.P.A; S.C Sindan-Pharma S.R.L	Italija; Rumunija	12.318.70	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti. kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039852	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL .	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 5 ml, 30 mg/5 ml	Vianex S.A.- Plant C	Grčka	2,627.10	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguca neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti. kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039850	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL`	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 16,7 ml, 100 mg/16,7 ml	Vianex S.A.- Plant C`	Grčka	8,318.90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguca neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti. kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039851	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 50 ml; 300 mg/50ml	Vianex S.A.- Plant C	Grčka	24,153.30	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039853	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (6mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	2,627.10	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039854	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 16.7 ml (6mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	8,318.90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja). 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluca, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039725	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL SANDOZ	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 20 mg/2 ml	Ebewe Pharma GmbH NFG.KG	Austrija	2,334.30	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta. PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039796	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL SANDOZ	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 80 mg/8 ml	Ebewe Pharma GmbH NFG.KG	Austrija	8,715.30	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta. PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039727	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2,334.30	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta. PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0036728	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	8,715.30	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta. PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039001	L01CD02	docetaksel	TOLNEXA	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 4 ml (80mg/4ml)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	8,715.30	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (som kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta. PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0033050	L01DB01	doksorubicin	SINDROXOCIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 10 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	616.90	-	-	-		
0033051	L01DB01	doksorubicin	SINDROXOCIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 50 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	1,366.90	-	-	-		
0033190	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena,1 po 5 ml (10 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	534.70	-	-	-		
0033191	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena,1 po 25 ml (50 mg/25 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,733.40	-	-	-		
0033102	L01DB01	doksorubicin	ADRIBLASTINA RD	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 mg, 1 po 5 ml	Actavis Italy S.p.A	Italija	851.10	-	-	-		
0033103	L01DB01	doksorubicin	ADRIBLASTINA RD	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 50 mg	Actavis Italy S.p.A	Italija	1,210.10	-	-	-		
0033060	L01DB02	daunorubicin	DAUNOBLASTINA	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (20 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A	Italija	1,120.30	-	-	-		
0033112	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	injekcija	1 po 10 mg sa rastv.	Actavis Italy S.P.A.	Italija	297.20	-	-	-		
0033113	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	injekcija	1 po 50 mg sa rastv.	Actavis Italy S.P.A.	Italija	1,485.90	-	-	-		
0033130	L01DB03	epirubicin	EPISINDAN	liofilizat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	297.20	-	-	-		
0033131	L01DB03	epirubicin	EPISINDAN	liofilizat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.	Rumunija, Italija	1,485.90	-	-	-		
0033121	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	1,046.70	-	-	-		
0033122	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	5,241.60	-	-	-		
0033123	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	10,483.40	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0033241	L01DB07	mitoksantron	MITOXANTRON "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena,1 po 10 mg/5 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	5,403.80	-	-	-	1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije; 2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0033242	L01DB07	mitoksantron	MITOXANTRON "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena,1 po 20 mg/10 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	10,362.30	-	-	-	1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije; 2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0033220	L01DC01	bleomicin	BLEOCIN-S	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 15000 i.j.	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	2,247.70	-	-	-		
0031330	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	rastvor za infuziju	1 po 10 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	333.30	-	-	-		
0031332	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	rastvor za infuziju	1 po 50 mg/100 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,310.90	-	-	-		
0031250	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN PFIZER	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 10 ml (1mg/ml)	Pfizer (Perth) PTY.Limited	Australija	793.20	-	-	-		
0031251	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN PFIZER	rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 50 ml (1 mg/ml)	Pfizer (Perth) PTY.Limited	Australija	914.00	-	-	-		
0031223	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.	Rumunija, Italija	338.80	-	-	-		
0031224	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.	Rumunija, Italija	1,332.70	-	-	-		
0031240	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN PFIZER	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	Pfizer (Perth) PTY.Limited	Australija	1,685.40	-	-	-		
0031306	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A.	Rumunija, Italija	1,685.40	-	-	-		
0031307	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A.	Rumunija, Italija	5,770.80	-	-	-		
0031364	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	2,437.40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031365	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	4,874.90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031367	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2,437.40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031368	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	4,874.90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031402	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2,437.40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031403	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	4,874.90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031383	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN KABI	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	2,437.40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031382	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN KABI	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	4,874.90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031371	L01XA03	oksaliplatin	GOXYRAL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Eriochem S.A.	Argentina	4,874.90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031370	L01XA03	oksaliplatin	GOXYRAL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Eriochem S.A.	Argentina	2,437.40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1036394	L01XE01	imatinib	ALVOTINIB	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd	Republika Srbija, Malta; Kipar	54,963.60	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajucih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečije interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039397	L01XE01	imatinib	ALVOTINIB	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd	Republika Srbija, Malta; Kipar	54,960.00	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajucih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečije interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039392	L01XE01	imatinib	IMATINIB PHARMASWISS	film tableta	blister, 120 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	54,963.60	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajucih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečije interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039006	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablete	blister, 60 po 100 mg	Krka, tovarna zdravil d.d	Slovenija	27,491.80	-	-	-	1. Lecenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečije interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039007	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablete	blister, 120 po 100 mg	Krka, tovarna zdravil d.d	Slovenija	54,983.60	-	-	-	1. Lecenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečije interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039009	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablete	blister, 30 po 400 mg	Krka, tovarna zdravil d.d	Slovenija	54,960.00	-	-	-	1. Lecenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečije interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039960	L01XE01	imatinib	IMAREM.	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	54,963.60	-	-	-	1. Lecenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039961	L01XE01	imatinib	IMAREM.	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd.	Kipar	54,960.00	-	-	-	1. Lecenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039386	L01XE01	imatinib	PLIVATINIB	film tableta	blister, 60 po 100mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	27,491.80	-	-	-	1. Lecenje pacijenata sa hronicnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039291	L01XX19	irinotekan	CAMPTO	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 100 mg/5 ml	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	2,883.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039290	L01XX19	irinotekan	CAMPTO	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039296	L01XX19	irinotekan	CAMPTO	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	9,834.30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039295	L01XX19	irinotekan	IRINOTESIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039294	L01XX19	irinotekan	IRINOTESIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A.	Rumunija; Italija	2,883.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039317	L01XX19	irinotekan	VIARITEC	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Vianex S.A.	Grčka	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039314	L01XX19	irinotekan	VIARITEC	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Vianex S.A.	Grčka	2,883.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039297	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40mg/2ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039298	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100mg/5ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	2,883.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039299	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 15 ml (300mg/15ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	9,834.30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039302	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (500mg/25ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	17,797.50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039100	L01XX32	bortezomib	VELCADE	prašak za rastvor za injekciju	1 po 3,5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	54,702.80	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i klinički imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039101	L01XX32	bortezomib	VELCADE	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	12,156.20	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i klinički imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039656	L01XX32	bortezomib	BORTEADE	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	54,702.80	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i klinički imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039110	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB PLIVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Hrvatska; Mađarska	12,156.20	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i klinički imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039111	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB PLIVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Hrvatska; Mađarska	54,702.80	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i klinički imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039601	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB PHARMAS	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.	Češka; Španija	54,702.80	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i klinički imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0036114	L01XX32	bortezomib	VORTEMYEL .	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O.	Republika Srbija; Španija; Češka	12,156.20	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0036115	L01XX32	bortezomib	VORTEMYEL .	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o; Synthon Hispania, S.L. Synthon S.R.O.	Republika Srbija; Španija; Češka	54,702.80	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13. t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija, b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0037021	L02AE02	leuprorelin	LUPRON	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (3,75 mg/ml)	Abbott Laboratories S.A.; AbbVie Logistics B.V.	Španija; Holandija	9,766.40	0,134 mg	348.99	-	1. Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.i 2. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037020	L02AE02	leuprorelin	LUPRON	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (11,25 mg/ml)	Abbott Laboratories S.A.; AbbVie Logistics B.V.	Španija; Holandija	28,962.20	0,134 mg	343.78	-	1 Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.i 2. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037022	L02AE02	leuprorelin	ELIGARD	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric sa praškom i napunjen injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 45 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	56,060.90	0,134 mg	166.94	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037023	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 3,75 mg	GP Pharm, SA	Španija	6,769.80	0,134 mg	316.81	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037024	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 22,5 mg	GP Pharm, SA	Španija	22,032.90	0,134 mg	132.36	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037070	L02AE03	goserelin	ZOLADEX	implant u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	10,385.20	0.129 mg	372.14	-	1. Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61); 5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci. 6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.i 2. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 6. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037071	L02AE03	goserelin	ZOLADEX LA	implant	napunjen injekcioni špric, 1 po 10,8 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	31,197.20	0.129 mg	372.63	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61); 3. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037091	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.	Francuska; Republika Srbija	10,146.10	0,134 mg	362.55	-	1. Endometrioza (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci , kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8) 5. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 5. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037092	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/ 2 ml)	Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.	Francuska; Republika Srbija	30,438.20	0,134 mg	362.55	-	1. Endometrioza (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci , kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037093	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	60,876.50	0,134 mg	362.55	-	1. Endometrioza (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci , kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037090	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 7 po 1 ml (0,1 mg/1 ml)	PharmaSwiss d.o.o.; Ipsen Pharma Biotech	Republika Srbija; Francuska	3,292.80	0,1 mg	470.40	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
0037095	L02AE04	triptorelin	DECAPEPTYL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 7 po 1 ml (0,1mg/ml)	Ferring GmbH: Ferring International Center SA	Nemačka; Švajcarska	3,292.80	0,1 mg	470.40	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039715	L02BA03	fluvestrant	FASLODEX	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom 2 po 250mg/5 ml	Astrazeneca UK limited	Velika Britanija	57,430.10	6.3 mg	953.34	-	Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se proceniuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na predhodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledecih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0069137	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,2 ml (12Mj./0,2ml)	Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.	Holandija; Republika Hrvatska	11,543.60	0,35 mg	6,908.77	-		STAC
0069138	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (30Mj./0,5ml)	Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.	Holandija; Republika Hrvatska	18,264.50	0,35 mg	4,261.72	-		STAC
0069139	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (48Mj./0,5ml)	Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.	Holandija; Republika Hrvatska	26,001.20	0,35 mg	3,791.84	-		STAC
0069130	L03AA02	filgrastim	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (30 Mj/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	3,652.90	0,35 mg	4,261.72	-		STAC
0069131	L03AA02	filgrastim	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (48 Mj/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	5,200.20	0,35 mg	3,791.81	-		STAC
0010221	L04AA04	anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića	GRAFALON	koncentrat za rastvor za infuziju	10 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemačka	296,901.00	0,1 g	29,690.10	-		STAC
0010220	L04AA04	anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunica	GRAFALON	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemačka	29,690.10	0,1 g	29,690.10	-		STAC
0010225	L04AA04	anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, zečiji	THYMOGLOBULINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 mg	Genzyme Polyclonals S.A.S.	Francuska	17,883.60	0,1 g	71,534.40	-		STAC
0014111	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 5 ml (50 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	10,568.10	0,25 g	1,056.81	-		STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.
0162440	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	rastvor za injekciju	5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	110.80	0,1 g	29.55	-		
0162192	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK HF	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	110.80	0,1 g	29.55	-		
1162485	M01AB05	diklofenak	RAPTEN-K	obložena tableta	blister, 10 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	61.20	0,1 g	12.24	-		
1162487	M01AB05	diklofenak	RAPTEN DUO	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	278.00	0,1 g	12.36	-		
1162190	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK HF	gastrorezistentna tableta	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	81.80	0,1 g	8.18	-		
1162193	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK FORTE HF	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	159.30	0,1 g	7.97	-		
1162441	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	gastrorezistentna tableta	blister, 20 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	81.80	0,1 g	8.18	-		
1162442	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	159.30	0,1 g	7.97	-		
5162445	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	supozitorija	strip, 10 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	143.30	0,1 g	28.66	-		
1162403	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN DUO	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	278.00	0,1 g	12.36	-		
1162402	M01AB05	diklofenak	DICLOFENAC-RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Remedica Ltd	Kipar	159.30	0,1 g	7.97	-		
1162520	M01AB15	ketorolak	ZODOL	film tableta	10 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche, Švajcarska	Republika Srbija	500.10	30 mg	150.03	-		
0162522	M01AB15	ketorolak	ZODOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 30 mg/ml	Hemofarm a.d. u saradnji sa ATHANS PHARMA UK LIMITED, Velika Britanija	Republika Srbija	350.80	30 mg	70.16	-		
0162162	M01AB15	ketorolak	KETOROLAC PEYTON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (30mg/ml)	Claris Injectables Limited	Indija	269.40	30 mg	53.88	-		
1162555	M01AB16	aceklofenak	AFLAMIL	film tableta	blister, 20 po 100 mg	Gedeon Richter PLC. u saradnji sa Almirall AG	Mađarska	377.00	0,2 g	37.70	-		
1161263	M01AC05	lornoksikam	XEFO RAPID	film tableta	blister, 20 po 8 mg	Takeda GmbH	Nemačka	384.70	12 mg	28.85	-		
0161022	M01AC06	meloksikam	MOVALIS	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1,5 ml (15 mg/1,5 ml)	Boehringer Ingolheim Espana S.A.	Španija	241.10	15 mg	48.22	-		
1162531	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	97.10	1,2 g	9.71	-		
1162512	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blister, 30 po 400 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	97.10	1,2 g	9.71	-		
1162513	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blister, 30 po 600 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	140.40	1,2 g	9.36	-		
1162423	M01AE02	naproksen	NAPROKSEN HF	film tableta	blister, 20 po 375 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	191.90	0,5 g	12.79	-		
0162068	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	rastvor za injekciju	10 ampula po 100 mg/2 ml	Lek farmaceutska druzba d.d.	Slovenija	364.50	0.15 g	54.68	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1162069	M01AE03	ketoprofen	KETONAL FORTE	film tableta	bočica staklena, 20 po 100 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	164.90	0,15 g	12.37	-		
1162220	M01AE11	tiaprofenska kiselina	TURGANIL	tableta	blister, 20 po 300 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	237.00	600 mg	23.70	-		
0082320	M03AB01	suksametonijum	MIDARINE	rastvor za injekciju/infuziju	100 po 2 ml (100 mg/2 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	4,704.30	-	-	-		ŠTAC
0082290	M03AC04	atrakurijum besilat	TRACRIUM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2,5 ml (25 mg/2,5 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	634.30	-	-	-		ŠTAC
0082291	M03AC04	atrakurijum besilat	TRACRIUM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	1,268.40	-	-	-		ŠTAC
0082302	M03AC04	atrakurijum-besilat	ACURMIL	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (50mg/5ml)	Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.P.A.	Italija	1,268.40	-	-	-		ŠTAC
0082052	M03AC09	rokuronijum bromid	ESMERON	rastvor za injekciju	10 po 5 ml (50 mg/5 ml)	N.V. Organon	Holandija	4,679.50	-	-	-		ŠTAC
0082410	M03AC11	cisatrakurijum besilat	NIMBEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 2,5 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH	Italija; Nemačka	1,010.70	-	-	-		ŠTAC
0082411	M03AC11	cisatrakurijum besilat	NIMBEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH	Italija; Nemačka	2,024.10	-	-	-		ŠTAC
0082111	M03AX01	toksin clostridium botulinum tip A	DYSPORT	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 2 po 500LD50jed.	Ipsen Biopharm Limited	Velika Britanija	57,723.40	-	-	-	1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8); 2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3); 3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).	ŠTAC
0082115	M03AX01	botulinum toksin tip A	BOTOX	prašak za rastvor za injekciju	bočice staklena, 1 po 100 j.	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	15,938.20	-	-	-	1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8); 2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3); 3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).	ŠTAC
0059089	M05BA06	ibandronska kiselina	BONVIVA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 3 ml (3 mg/3 ml)	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	1,811.60	6mg	3,623.20	-	Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguca primena oralnih bisfosfonata zbog nemogucnosti efikasne apsorpcije. Nemogucnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa: - o postojanju hronicnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	ŠTAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0059068	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	1 po 3ml (3mg/3ml)	Synthon BV; Synthon Hispania SL	Holandija; Španija	1,811.60	6mg	3,623.20	-	Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguca primena oralnih bisfosfonata zbog nemogucnosti efikasne apsorpcije. Nemogucnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa: - o postojanju hronicnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	ŠTAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
9080161	N01AB08	sevofluran	SEVORANE	para za inhalaciju, tecnost	boca plastična, 1 po 250 ml (100%)	Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie S.R.L.	Velika Britanija; Italija	15,045.20	-	-	-		ŠTAC
0080000	N01AF03	tiopental - natrijum	THIOPENTAL INJECTION BP 500 mg	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 500 mg	Rotexmedica GmbH	Nemačka	9,897.50	-	-	-		
0087555	N01AH01	fentanil	FENTANYL	rastvor za injekciju	50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Janssen Pharmaceutica N.V.	Italija; Belgija	6,787.00	-	-	-		ŠTAC
0087559	N01AH01	fentanil	FENTANYL PANPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 10 ml (0,5mg/10ml)	Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk	Nemačka	1,357.40	-	-	-		ŠTAC
0087575	N01AH02	alfentanil	RAPIFEN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Janssen Pharmaceutica N.V.	Italija; Belgija	11,381.30	-	-	-		ŠTAC
0087171	N01AH03	sufentanil	SUFENTA forte	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)	Glaxo Smith Kline Manufacturing S.p.a	Italija	1,333.50	-	-	-		ŠTAC
0087621	N01AH06	remifentanil	ULTIVA	prašak za koncentrat za rastvor za iinjekciju/ infuziju	bočica staklena, 5 po 2 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Glaxo Operations UK Limited	Italija; Velika Britanija	4,126.00	-	-	-		ŠTAC
0087623	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1 mg	Hameln RSD A.S.	Slovačka	1,733.10	-	-	-		ŠTAC
0087624	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 2 mg	Hameln RSD A.S.	Slovačka	3,210.60	-	-	-		ŠTAC
0087625	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 5 mg	Hameln RSD A.S.	Slovačka	8,091.10	-	-	-		ŠTAC
0080300	N01AX07	etomidat	HYPNOMIDATE	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Janssen Pharmaceutica N.V.	Italija; Belgija	567.00	-	-	-		ŠTAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0080420	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius	emulzija za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 20 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	1,204.70	-	-	-		ŠTAC
0080421	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius	emulzija za injekciju/infuziju	boca staklena, 1 po 50 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	668.00	-	-	-		ŠTAC
0080423	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius	emulzija za injekciju/infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	1,181.70	-	-	-		ŠTAC
0080432	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 1%	emulzija za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 20 ml (10 mg/1ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	1,204.70	-	-	-		ŠTAC
0080431	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 1%	emulzija za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 50 ml (10 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	6,680.00	-	-	-		ŠTAC
0080433	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 2%	emulzija za injekciju/infuziju	boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	10,926.90	-	-	-		ŠTAC
0081561	N01BB01	bupivakain	MARCAINE 0,5%	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 20 ml (5 mg/ml)	Recipharm Monts	Francuska	1,053.40	-	-	-		ŠTAC
0081562	N01BB01	bupivakain	MARCAINE SPINAL 0,5%	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Cenexi- Fontenay Sous Bois	Francuska	2,294.50	-	-	-		ŠTAC
0081563	N01BB01	bupivakain	MARCAINE SPINAL 0,5% HEAVY	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Cenexi- Fontenay Sous Bois	Francuska	2,450.60	-	-	-		ŠTAC
0081013	N01BB01	bupivakain	BUPIVACAIN DELTAMEDICA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5ml (5mg/ml)	Deltamedica GMBH	Nemačka	1,995.00	-	-	-	Hirurška anestezija	ŠTAC
0081222	N01BB02	lidokain	LIDOKAIN-HLORID 1%	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg/3,5ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	224.20	-	-	-		
0081560	N01BB02	lidokain	LIDOKAIN-HLORID 2%	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,274.60	-	-	-		
0081623	N01BB02	lidokain	LIDOCAINE SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (10mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	491.20	-	-	-		
0081626	N01BB02	lidokain	LIDOCAINE SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 2 ml (20mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	2,549.20	-	-	-		
0081011	N01BB10	levobupivakain	CHIROCAINE	rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (5 mg/ml)	Abbvie S.R.L.	Italija	4,324.40	-	-	-		ŠTAC
0081540	N01BB52	lidokain, adrenalin (epinefrin)	LIDOKAIN 2%-ADRENALIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg+0,025 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	911.90	-	-	-		
4081718	N01BB52	lidokain, hlorheksidin	CATHEJELL SA LIDOKAINOM	gel	aplikator, 25 po 12,5g (20mg/g+0,5mg/g)	Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.	Austrija	2,678.90	-	-	-	Upotreba prilikom aplikacije katetera, endoskopa ili drugih medicinskih instrumenata u uretru.	Samo za decu.
0087854	N02AA01	morfin	MORFIN HIDROHLORID ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula,10 po 20 mg/ml	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	703.40	30 mg	105.51	-		
0087018	N02AB02	petidin hidrohlorid	DOLANTIN	rastvor za injekciju	5 po 2 ml/100 mg	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Delpharm Dijon	Nemačka; Francuska	482.30	400 mg	385.84	-		ŠTAC
0087531	N02AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	167.60	0,3 g	201.12	-		
0087533	N02AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	233.30	0,3 g	139.98	-		
0086431	N02BB02	metamizol natrijum	NOVALGETOL	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2,5 g/5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,432.70	3 g	34.38	-		
0086418	N02BB02	metamizol natrijum	ANALGIN	rastvor za injekciju	ampula 50 po 2,5 g/5 ml	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1,432.70	3 g	34.38	-		
0086930	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL PHARMASWISS	rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (10 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,687.00	3 g	506.10	-		
0088333	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, 10 po 50 ml (10mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	1,409.10	3g	845.46	-		
0088334	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, 10 po 100 ml (10mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	1,687.00	3g	506.10	-		
0086666	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL ACTAVIS	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)	S.M. Farmaceutici SRL	Italija	1,687.00	3 g	506.10	-		
0084520	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON NATRIJUM	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,420.90	0,1 g	129.17	-		
0085353	N04BB01	amantadin sulfat	PK MERZ	rastvor za infuziju	10 po 500 ml (200 mg)	Merz Pharma GmbH	Nemačka	11,961.60	-	-	-	U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.	ŠTAC
0070261	N05AB02	flufenazin	MODITEN Depo	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (25 mg /ml)	Krka d.d.	Slovenija	1,606.80	1 mg	12.85	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070207	N05AD01	haloperidol	HALDOL DEPO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija	Slovenija	1,913.00	3,3 mg	25.25	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070200	N05AD01	haloperidol	HALDOL	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ml)	Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija	Slovenija	325.90	8 mg	52.14	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070654	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po 1,2 ml (20 mg/ml)	Pfizer PGM	Francuska	2,091.00	40 mg	3,485.00	-	1. Agitacija kod shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0070925	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 25 mg	Cilag AG	Švajcarska	8,333.40	2,7 mg	900.01	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompliјantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070926	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu,1 po 37.5 mg	Cilag AG	Švajcarska	10,813.70	2,7 mg	778.59	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompliјantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070927	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu,1 po 50 mg	Cilag AG	Švajcarska	13,298.70	2,7 mg	718.13	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompliјantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0070131	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	18,033.50	2,5 mg	901.68	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070132	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.75 ml (75 mg/0,75 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	23,425.60	2,5 mg	780.85	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070134	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	28,920.00	2,5 mg	720.50	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070133	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	43,198.10	2,5 mg	719.97	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070135	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,875 ml (175 mg/0,875ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	53,983.40	2,5 mg	771.19	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070136	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,315 ml (263 mg/1,315ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	70,156.10	2,5 mg	666.88	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070137	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,75 ml (350mg/1,750ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	66,341.80	2,5 mg	616.73	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070138	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 2,625 ml (525 mg/2,625ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	129,477.30	2,5 mg	616.56	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0071123	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	rastvor za injekciju /infuziju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	287.90	10 mg	28.79	-		
0071834	N05CD08	midazolam	DORMICUM	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 5 mg/5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	548.30	15 mg	164.49	-		ŠTAC
0071835	N05CD08	midazolam	DORMICUM	rastvor za injekciju	5 po 15 mg/3 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	732.00	15 mg	146.40	-		ŠTAC
0071838	N05CD08	midazolam	MIDAZOLAM PANPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 5ml (5mg/5ml)	Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk	Nemačka	699.90	15mg	209.97	-		ŠTAC
0071839	N05CD08	midazolam	MIDAZOLAM PANPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 3ml (15mg/3mL)	Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk	Nemačka	1,464.00	15mg	146.40	-		ŠTAC
0089000	N06BC01	kofein	PEYONA	rastvor za infuziju i oralni rastvor	ampula, 10 po 1ml (20mg/ml)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	24,245.60	0.4g	96,982.40	-	Terapija apnee kod prevremeno rođene novorođenčadi (P07.0; P07.1; P07.3).	
0088065	N07AA01	neostigmin metilsulfat	NEOSTIGMINE/ COOPER	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ml)	Cooper S.A.	Grčka	3,653.90	2 mg	58.46	-		ŠTAC
0088067	N07AA01	neostigmin-metilsulfat	NEOSTIGMINE/ COOPER	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (2.5mg/ml)	Cooper S.A.	Grčka	730.80	2 mg	58.46	-		ŠTAC
2087506	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rastvor	bočica, 1 po 100 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	899.70	25 mg	22.49	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087507	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rastvor	bocs, 1 po 1000 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	5,001.90	25 mg	12.50	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087516	N07BC02	metadon	METADON MOLTENI	oralni rastvor	bočica plastična, 1 po 1000 ml (5 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	5,284.90	25 mg	26.42	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087501	N07BC02	metadon	METADON KRKA	oralni rastvor	1 po 1000ml (10mg/ml)	Krka, tovarna zdravil d.d	Slovenija	5,001.90	25mg	12.50	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0058334	R06AC03	hloropiramin	SYNOPEN	rastvor za injekciju	ampula,10 po 20 mg/2 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GMBH	Hrvatska; Nemačka	836.10	20 mg	83.61	-		
0119150	R07AA02	poraktant alfa	CUROSURF	suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml)	Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija; Austrija	92,252.30	0,18 g	61,501.53	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0119157	R07AA02	fosfolipidna frakcija iz pluca goveda (surfakant)	ALVEOFACT	prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1.2 ml (45mg/ml)	Lyomark Pharma GmbH	Nemačka	24,658.90	160 mg	73,063.41	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0119158	R07AA02	fosfolipidna frakcija iz pluca goveda (surfakant)	ALVEOFACT	prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.4 ml (45mg/ml)	Lyomark Pharma GmbH	Nemačka	48,579.20	160 mg	71,969.19	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0180030	V03AB14	protamin-sulfat	PROTAMIN SULFAT	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,271.00	-	-	-		ŠTAC
0189100	V03AB25	flumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (0,5 mg/5 ml)	Cheplapharm Arzneimittel GMBH	Nemačka	3,183.40	-	-	-		ŠTAC
0189101	V03AB25	flumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 10 ml (1 mg/10 ml)	Cheplapharm Arzneimittel GMBH	Nemačka	7,066.10	-	-	-		ŠTAC
0189102	V03AB25	flumazenil	FLUMAZENIL B. BRAUN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (0,1mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	3,183.40	-	-	-		ŠTAC
0189103	V03AB25	flumazenil	FLUMAZENIL B. BRAUN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 10 ml (0,1mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	7,066.10	-	-	-		ŠTAC

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0189011	V03AB35	sugamadeks	BRIDION	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 2 ml (100mg/ml)	N.V. Organon	Holandija	63,004.20	-	-	-	Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).	Samo za decu.
1189121	V03AC03	deferasiroks	EXJADE	tableta za oralnu suspenziju	blistor, 28 po 250mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	40,564.30	-	-	-	Terapija hroničnog preopterećenja gvožđem koje je nastalo kao posledica čestih transfuzija krvi (≥7ml/kg/mesec koncentrovanih eritrocita) kod pacijenata sa beta talasemijom major, kao i za terapiju hroničnog preopterećenja gvožđem koje je nastalo kao posledica transfuzija krvi kada je terapija deferoksaminom kontraindikovana ili neadekvatna.	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi hematologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0184027	V03AF03	kalcijum folinat	LEUCOVORIN Kalcijum	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 50 mg/5 ml	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	2,516.50	60 mg	301.98	-		ŠTAC
0012070	V04CF01	prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu	PPD-T TUBERKULIN	rastvor za injekciju	10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	21,230.30	-	-	-		
0176042	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE	rastvarač za parenteralnu upotrebu	ampula, 50 po 5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	710.90	-	-	-		
0176000	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN	rastvarač za parenteralnu upotrebu	boca plastična, 20 po 100ml	B.Braun Melsungen AG. B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,477.50	-	-	-		
0176001	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN	rastvarač za parenteralnu upotrebu	boca plastična, 10 po 250 ml	B.Braun Melsungen AG. B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	779.70	-	-	-		
0176002	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN	rastvarač za parenteralnu upotrebu	boca plastična, 10 po 500ml	B.Braun Melsungen AG. B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	934.50	-	-	-		
0199210	V08AB02	johmeksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 50 ml (300 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	14,915.90	-	-	-		ŠTAC
0199211	V08AB02	johmeksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	32,391.60	-	-	-		ŠTAC
0199214	V08AB02	johmeksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 50 ml (350 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	15,338.20	-	-	-		ŠTAC
0199215	V08AB02	johmeksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 100 ml (350 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	30,676.50	-	-	-		ŠTAC
0199217	V08AB02	johmeksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 200 ml (350 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	58,267.60	-	-	-		ŠTAC
0199218	V08AB02	johmeksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 6 po 500 ml (350 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland Limited	Irska	90,563.90	-	-	-		ŠTAC
0194292	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 300	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 ml (623,4 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	18,496.50	-	-	-		ŠTAC
0194293	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 300	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 100 ml (623,4 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	34,119.00	-	-	-		ŠTAC
0194255	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	21,035.30	-	-	-		ŠTAC
0194256	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 100 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	42,069.70	-	-	-		ŠTAC
0194257	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 200 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	84,073.00	-	-	-		ŠTAC
0194259	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 6 po 500 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	168,088.30	-	-	-		ŠTAC
0199406	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca,10 po 50 ml sa 300 mg joda/ml (63,6%)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	14,965.20	-	-	-		ŠTAC
0199411	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	22,241.80	-	-	-		ŠTAC
0199413	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 100 ml (300mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	29,655.70	-	-	-		ŠTAC
0199412	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	44,483.60	-	-	-		ŠTAC
0199415	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	59,311.50	-	-	-		ŠTAC
0199416	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	63,274.60	-	-	-		ŠTAC
0199407	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 50 ml sa 350 mg joda/ml (74,1%)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	17,078.10	-	-	-		ŠTAC
0199408	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	33,302.20	-	-	-		ŠTAC
0199409	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	54,049.60	-	-	-		ŠTAC
0199410	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ml)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	63,274.60	-	-	-		ŠTAC
0199463	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 50 ml (320 mg I/ml)	GE Healthcare AS	Norveška	20,959.60	-	-	-		
0199464	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 100 ml (320 mg I/ml)	GE Healthcare AS	Norveška	41,572.10	-	-	-		
0199477	V08AB10	jomeprol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (300mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	2,870.90	-	-	-		ŠTAC
0199479	V08AB10	jomeprol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (300mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	5,345.80	-	-	-		ŠTAC
0199471	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (350mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	3,068.90	-	-	-		ŠTAC
0199473	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (350mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	5,939.80	-	-	-		ŠTAC
0199472	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (350mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	15,344.40	-	-	-		ŠTAC
0199465	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (400mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	4,058.80	-	-	-		ŠTAC
0199466	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (400mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	8,117.70	-	-	-		ŠTAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199467	V08AB10	jorneprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (400mg I/mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	16,766.60	-	-	-		ŠTAC
3192101	V08BA02	barijum sulfat	BARIJUM SULFAT	oralna/rektalna suspenzija	kontejner plastični, 1 po 5 l (1 g/ml)	Hemofarm d.o.o	Republika Srbija	7,314.50	-	-	-		
0199430	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEVIST	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 20 ml (0,5mmol/ml)	Bayer Pharma AG	Nemačka	23,881.00	-	-	-		ŠTAC
0199015	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	785.90	-	-	-		ŠTAC
0199021	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 5 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	7,858.80	-	-	-		ŠTAC
0199011	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	1,571.70	-	-	-		ŠTAC
0199017	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	15,716.70	-	-	-		ŠTAC
0199012	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 15 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2,356.90	-	-	-		ŠTAC
0199018	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	23,568.60	-	-	-		ŠTAC
0199013	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2,388.10	-	-	-		ŠTAC
0199019	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	23,881.00	-	-	-		ŠTAC
0199014	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 30 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	3,583.00	-	-	-		ŠTAC
0199020	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	35,830.00	-	-	-		ŠTAC
0199010	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	9,647.70	-	-	-		ŠTAC
0199016	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	96,477.00	-	-	-		ŠTAC
0199422	V08CA03	gadodiamid	OMNISCAN	rastvor za injekciju	0,5 mmol/ml (287mg/ml) bočica, 10 po 20 ml	GE Healthcare Ireland; GE Healthcare AS	Irska; Norveška	23,547.80	-	-	-		ŠTAC
0199491	V08CA08	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (529 mg/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	3,167.90	-	-	-		ŠTAC
0199490	V08CA08	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 15 ml (529 mg/ml)	Patheon Italia S.P.A	Italija	4,751.80	-	-	-		ŠTAC
0199492	V08CA08	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 20 ml (529 mg/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	6,204.50	-	-	-		ŠTAC
0199466	V08CA09	gadobutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 30 ml (1mmol/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	219,152.90	-	-	-		ŠTAC
0199487	V08CA09	gadobutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 7,5 ml (1 mmol/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	28,458.40	-	-	-		ŠTAC
0199535	V08CA10	gadoksetinska kiselina	PRIMOVIST	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer Farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	19,443.30	-	-	-		ŠTAC

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069400	B02BX04	romiplostim	NPLATE ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 250 mcg	Amgen Europe B.V.	Holandija	61,269.40	30 mcg	7,352.33	-	Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3). 1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije 2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
1069111	B02BX05	eltrombopag	REVOLADE ◊	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	100,727.00	50 mg	7,194.79	-	Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure kod pacijenata uzrasta od jedne godine i starijih (D69.3): 1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije 2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.
1069110	B02BX05	eltrombopag	REVOLADE ◊	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	201,282.20	50 mg	7,188.65	-	Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure kod pacijenata uzrasta od jedne godine i starijih (D69.3): 1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije 2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.
0069152	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 6 po 0,5 ml (2000 i.j./0,5 ml)	Cilag AG; Janssen Biologics B.V.	Švajcarska; Holandija	7,180.00	1000 i.j.	598.33	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069145	B03XA01	epoetin alfa	BINOCRIT	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	6 po 1ml (2000IJ/1ml)	Sandoz GmbH	Austrija	5,058.20	1000 i.j.	421.52	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069147	B03XA01	epoetin alfa	BINOCRIT	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 6 po 0,4ml (4000i.j./0,4ml)	Sandoz GmbH	Austrija	10,116.40	1000 i.j.	421.52	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069165	B03XA01	epoetin beta	RECORMON	rastvor za injekciju. špric	napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	6,565.00	1000 i.j.	547.08	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069222	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	3,613.10	1000 i.j.	602.18	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069227	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	7,082.70	1000 i.j.	590.23	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069235	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj špric 6 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	14,040.00	1000 i.j.	585.00	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069223	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 1 ml (10000 i.j./ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	5,354.00	1000 i.j.	535.40	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069224	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (20000 i.j./0,5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	12,043.20	1000 i.j.	602.16	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069228	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,75 ml (30000 i.j./0,75 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	18,064.90	1000 i.j.	602.16	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069939	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	1,338.20	4,5 mcg	602.19	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069924	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	2,676.30	4,5 mcg	602.17	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069928	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric 1 po 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	4,014.60	4,5 mcg	602.19	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069934	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	8,028.90	4,5 mcg	602.17	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069206	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 50 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	8,837.90	4 mcg	707.03	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069205	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 75 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	13,227.40	4 mcg	705.46	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069203	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 150 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	26,393.30	4 mcg	703.82	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069213	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 30 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	5,324.50	4 mcg	709.93	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069212	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	21,126.80	4 mcg	704.23	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
1328624	J05AP09	dasabuvir	EXVIERA	film tableta	blister, 56 po 250 mg	Abbvie Deutschland GMBH &CO.KG	Nemačka	91,614.50	500 mg	3,271.95	-	Hronični hepatitis C za genotip 1 u kombinaciji sa lekom ombitasvir/paritaprevir/ritonavir(B18.2): 1. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa ekstrahepatičnim manifestacijama; 2. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i bubrežna insuficijencija. 3. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i limfomi odnosno hemofilije: 4. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa HBV i/ili HIV koinfekcijom; 5. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO
1328524	J05AP53	ombitasvir, paritaprevir, ritonavir	VIEKIRAX	film tableta	blister, 56 po (12.5mg+75mg+50mg)	Abbvie Deutschland GMBH &CO.KG	Nemačka	1,044,860.80	2 tablete	37,316.46	-	Hronični hepatitis C za genotip 1 u kombinaciji sa lekom dasabuvir i za genotip 4 (B18.2): 1. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa ekstrahepatičnim manifestacijama 2. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i bubrežna insuficijencija 3. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i limfomi odnosno hemofilije: 4. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa HBV i/ili HIV koinfekcijom; 5. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328001	J05AX15	sofosbuvir	SOVALDI	film tableta	boca plastična, 28 po 400mg	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	1,134,237.40	400 mg	40,508.48	-	Hronični hepatitis C za genotip 2 sa ribavirinom (B18.2): 1. Pacijenti nakon transplantacije; 2. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa ekstrahepatičnim manifestacijama; 3. Kompenzovana ciroza jetre i bubrežna insuficijencija (isključivo sa klirensom kreatinina preko 50ml/min); 4. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre i limfomi odnosno hemofilije, 5. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa HBV/HCV i/ili HIV/HCV koinfekcijom; 6 Prethodno neuspešno lečena kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre; Hronični hepatitis C za genotip 3 u kombinaciji sa pegilovanim interferonom i ribavirinom (B18.2): 1. Pacijenti nakon transplantacije; 2. Kompenzovana ciroza jetre sa ekstrahepatičnim manifestacijama; 3 Kompenzovana ciroza jetre i bubrežna insuficijencija (isključivo sa klirensom kreatinina preko 50ml/min); 4. Kompenzovana ciroza jetre i limfomi odnosno hemofilije; 5. Kompenzovana ciroza jetre sa HBV/HCV i/ili HIV/HCV koinfekcijom; 6. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
1328630	J05AX65	sofosbuvir, ledipasvir	HARVONI	film tableta	boca plastična, 28 po (400mg+90mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	1,158,658.90	1 tableta	41,380.68	-	Hronični hepatitis C za genotip 1 i 4(B18.2): 1 Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre nakon transplantacije; 2. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa ekstrahepatičnim manifestacijama; 3. Kompenzovana ciroza jetre i bubrežna insuficijencija (isključivo sa klirensom kreatinina preko 30ml/min); 4. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre i limfomi odnosno hemofilije, 5. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa HBV i/ili HIV koinfekcijom; 6. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
1328444	J05AX68	elbasvir, grazoprevir	ZEPATIER	film tableta	blister, 28 po (50 mg+100mg)	Schering-Plough Labo NV	Belgija	833,641.70	1 tableta	29,772.92	-	Hronični hepatitis C za genotip 1 i 4(B18.2): 1. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa ekstrahepatičnim manifestacijama; 2. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i bubrežna insuficijencija, 3. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i limfomi odnosno hemofilije; 4. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa HBV i/ili HIV koinfekcijom; 5 Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0034413	L01BA04	pemetreksed	ALIMTA ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Lilly France	Francuska	96,057.40	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0034667	L01BA04	pemetreksed	MARTXEL ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Eriochem S.A.	Argentina	51,623.60	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0034666	L01BA04	pemetreksed	MARTXEL ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Eriochem S.A.	Argentina	9,857.80	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034668	L01BA04	pemetreksed	PEMETREXED ALVOGEN ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O	Španija; Češka	9,857.60	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0034669	L01BA04	pemetreksed	PEMETREXED ALVOGEN ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O	Španija; Češka	51,623.60	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0034700	L01BA04	pemetreksed	PEMETREKSED PHARMAS ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania S.L.	Češka; Španija	51,623.60	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0039120	L01CD04	cabazitaksel	JEVTANA ◊	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 4,5 ml (60 mg/1,5 ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GMBH	Nemačka	380,081.80	-	-	-	Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61). Lek se primenjuje sa prednizonom ili prednizolonom.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
0033181	L01DB06	idarubicin	ZAVEDOS ◊	liofilizat za rastvor za injekciju	1 po 10 mg	Actavis Italy S.P.A.	Italija	12,406.00	-	-	-	Svi oblici akutnih leukemija i limfoblastni limfom.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i klinički imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014140	L01XC02	rituksimab	MABTHERA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	39,766.10	-	-	-	◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8). ◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82). 3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to: a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2). Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi. ◊ 4. Hronična limfocitna leukemija (C91.1): a) prva linija: - u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC; b) druga linija: - ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije; - ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC; - ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO
0014141	L01XC02	rituksimab	MABTHERA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	99,329.60	-	-	-	◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8). ◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip. folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82). 3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to: a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2). Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi. ◊ 4. Hronična limfocitna leukemija (C91.1): a) prva linija: - u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC; b) druga linija: - ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije; - ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC; - ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014142	L01XC02	rituksimab	MABTHERA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 11.7mL (1400mg/11.7mL)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	175,424.70	-	-	-	◊ 1. Nehočkinski limfom, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8) ◊ 2. Nehočkinski limfom, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Klinika za hematologiju KC Kragujevac, -Vojnomedicinska akademija.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039345	L01XC03	trastuzumab	HERCEPTIN ◊	prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	176,297.40	-	-	-	Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+). a) adjuvantna hemioterapija - kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima); b) metastatska bolest- PS 0 ili 1 u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo trastuzumab do progresije bolesti; c) lokalno uznapredovali karcinom dojke, inflamatorni ili karcinom dojke u ranom stadijumu sa visokim rizikom od recidiva: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom tokom 4 ciklusa a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
0039346	L01XC03	trastuzumab	HERCEPTIN ◊	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (600mg/5ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	158,667.70	-	-	-	Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+). a) adjuvantna hemioterapija - kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima); b) metastatska bolest- PS 0 ili 1 u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo trastuzumab do progresije bolesti; c) lokalno uznapredovali karcinom dojke, inflamatorni ili karcinom dojke u ranom stadijumu sa visokim rizikom od recidiva: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom tokom 4 ciklusa a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
0039153	L01XC06	cetuksimab	ERBITUX ◊	rastvor za infuziju	bočica staklena,1 po 20 ml (5 mg/ml)	Merck KGaA	Nemačka	19,753.60	-	-	-	1. Karcinom kolorektuma: a) metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija ili u kombinaciji sa irinotekanom; b) Terapija pacijenta sa RAS wild-type kolorektalnim karcinomom, koji eksprimiraju receptore za epidermalni faktor rasta (EGFR), potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri. klinički stadijum IVb, kao prva linija terapije u kombinaciji sa FOLFOX-om ili sa hemioterapijom na bazi irinotekana, do postizanja resektabilnosti metastaza i odgovarajuće operacija istih, do maksimalnih 16 nedeljnih ciklusa, 2. Planocelularni karcinom glave i vrata: a) istovremeno sa radioterapijom kod pacijenata sa PS 0 ili 1 u lokalno uznapredovalom, inoperabilnom planocelularnom karcinomu usne duplje i orofarinksa, kod kojih je lečenje započeto indukcionom hemioterapijom; b) lokalno uznapredovala, inoperabilna bolest, u kombinaciji sa radioterapijom, PS 0 ili 1. u pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platine; c) u kombinaciji sa standardnom hemioterapijom (5FU-cisplatin ili 5FU-karboplatin) prva linija za rekurentni planocelularni karcinom glave i vrata koji nije podoban za lokoregionalni tretman, bez egzulceracije, PS 0-1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Niš, - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0039401	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	31,143.10	-	-	-	1.Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa. 2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabini) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga, a potom kao monoterapija u odsustvu progresije do ukupno godinu dana (C56; C57; C48).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039400	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	124,728.20	-	-	-	1.Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa. 2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabilni) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga, a potom kao monoterapija u odsustvu progresije do ukupno godinu dana (C56; C57; C48).	STAC, Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
0039505	L01XC08	panitumumab	VECTIBIX ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5ml (20mg/ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	42,714.60	-	-	-	Karcinom kolorektuma. a) metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija. b) Terapija pacijenta sa RAS wild-type kolorektalnim karcinomom, koji eksprimiraju receptore za epidermalni faktor rasta (EGFR), potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, kao prva linija terapije u kombinaciji sa FOLFOX-om ili sa FOLFIRI-jem, do postizanja resektabilnosti metastaza i odgovarajuće operacija istih, do maksimalnih 8 dvonedeljnih ciklusa.	STAC, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0014000	L01XC12	brentuksimab vedotin	ADCETRIS ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50mg	Takeda Italia S.P.A.	Italija	368,073.40	-	-	-	1. Lečenje odraslih bolesnika sa relapsom ili refraktarnim CD30 pozitivnim Hodgkin limfomom (C81.0-C81.4) a) nakon autologe transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ili b) nakon najmanje dva prethodna ciklusa lečenja kod bolesnika kod kojih je autologa transplantacija kontraindikovana 2. Lečenje odraslih bolesnika (PS 0-2) sa CD30-pozitivnim Hodginovim limfomom kao konsolidaciona terapija nakon autologe transplantacije matičnih ćelija hematopoeze kod bolesnika sa visokim rizikom za relaps ili progresiju bolesti (C81.1; C81.2;C81.3) 3.Lečenje odraslih bolesnika sa relapsom ili refrakternim sistemskim anaplastičnim limfomom velikih ćelija (sALCL) (C 84.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
0039507	L01XC13	pertuzumab	PERJETA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 14ml (420mg/14ml)	F.Hoffmann-La Roche LTD	Švajcarska	278,549.90	-	-	-	Karcinom dojke: a) neoadjuvantno lečenje tokom 4 ciklusa u kombinaciji sa trastuzumabom i taksanskom hemioterapijom pacijenata sa HER2-pozitivnim, lokalno uznapredovalim, inflamatornim ili karcinomom dojke u ranom stadijumu sa visokim rizikom od recidiva, a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe pacijenata lečenje se nastavlja ordiniranjem trastuzumaba u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu trastuzumaba u neoadjuvantnom pristupu. b) metastatski HER2- pozitivni rak dojke- PS 0 ili 1. prva terapijska linija za metastatsku bolest, u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom (6-8 ciklusa), a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti sa pertuzumabom u kombinaciji sa trastuzumabom do progresije bolesti.	STAC, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
0039347	L01XC14	trastuzumab emtanzin	KADCYLA ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Roche Pharma AG	Nemačka	193,205.70	-	-	-	Karcinom dojke, kao monoterapija za lečenje odraslih pacijenata HER2 pozitivnim, neresektabilnim, lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke sa PS 0-1, koji su prethodno obavezno primali trastuzumab i taksan odvojeno ili u kombinaciji, a moguće i pertuzumab i/ili lapatinib. Pacijenti bi trebalo da su: - primali prethodnu terapiju za lokalno uznapredovalu ili metastatsku bolest, ili - dobili relaps bolesti tokom ili u roku od šest meseci od završetka ajduvantne terapije trastuzumabom.	STAC, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
0039348	L01XC14	trastuzumab emtanzin	KADCYLA ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 160 mg	Roche Pharma AG	Nemačka	308,922.00	-	-	-	Karcinom dojke, kao monoterapija za lečenje odraslih pacijenata HER2 pozitivnim, neresektabilnim, lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke sa PS 0-1, koji su prethodno obavezno primali trastuzumab i taksan odvojeno ili u kombinaciji, a moguće i pertuzumab i/ili lapatinib. Pacijenti bi trebalo da su: - primali prethodnu terapiju za lokalno uznapredovalu ili metastatsku bolest, ili - dobili relaps bolesti tokom ili u roku od šest meseci od završetka ajduvantne terapije trastuzumabom.	STAC, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039004	L01XC15	obinutuzumab	GAZYVA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 40 ml (1000mg/40ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	136,706.80	-	-	-	1. Lek obinutuzumab se primenjuje u kombinaciji sa hlorambucilom u prvoj terapijskoj liniji kod bolesnika sa hroničnom limfocitnom leukemijom kod kojih je komorbiditetni indeks CIRS≥6. 2. Lek obinutuzumab u kombinaciji sa hemioterapijom, nakon čega sledi terapija održavanja lekom obinutuzumab kod pacijenata kod kojih je postignut odgovor, indikovan je u terapiji pacijenata sa prethodno nelečenim uznapredovalim folikularnim limfomom (C82).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0039402	L01XC18	pembrolizumab	KEYTRUDA ◊	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Schering Plough Labo N.V	Belgija	189,329.50	-	-	-	Lečenje uznapredovalog (neresektabilnog ili metastatskog) melanoma kod odraslih, kao monoterapija PS 0-1 (C43)	Odobrava se primena četiri ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0039403	L01XC18	pembrolizumab	KEYTRUDA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (25mg/ml)	Schering Plough Labo N.V	Belgija	313,509.00	-	-	-	Lečenje uznapredovalog (neresektabilnog ili metastatskog) melanoma kod odraslih, kao monoterapija PS 0-1 (C43)	Odobrava se primena četiri ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
1039398	L01XE02	gefitinib	IRESSA ◊	film tableta	30 po 250 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	219,721.50	-	-	-	Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.
1039402	L01XE03	erlotinib	TARCEVA ◊	film tableta	blister, 30 po 25 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	29,400.50	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.
1039403	L01XE03	erlotinib	TARCEVA ◊	film tableta	blister, 30 po 100 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	71,536.10	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039404	L01XE03	erlotinib	TARCEVA ◊	film tableta	blister, 30 po 150 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	111,904.00	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039409	L01XE03	erlotinib	INOPRAN ◊	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd	Kipar	29,400.50	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija
1039410	L01XE03	erlotinib	INOPRAN ◊	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Remedica Ltd	Kipar	71,536.10	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039411	L01XE03	erlotinib	INOPRAN ◊	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Remedica Ltd	Kipar	111,904.00	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039408	L01XE03	erlotinib	ERLOTINIB ACTAVIS ◊	film tableta	blister, 30 po 25 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	29,400.50	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039407	L01XE03	erlotinib	ERLOTINIB ACTAVIS ◊	film tableta	blister, 30 po 100 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	71,536.10	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039406	L01XE03	erlotinib	ERLOTINIB ACTAVIS ◊	film tableta	blister, 30 po 150 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	111,904.00	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039703	L01XE04	sunitinib	SUTENT ◊	kapsula, tvrda	blister, 28 po 12.5 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	117,900.30	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.
1039704	L01XE04	sunitinib	SUTENT ◊	kapsula, tvrda	blister, 28 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	234,667.50	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.
1039706	L01XE04	sunitinib	SUTENT ◊	kapsula, tvrda	blister, 28 po 50 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	468,958.20	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039151	L01XE05	sorafenib	NEXAVAR ◊	film tableta	blister, 112 po 200 mg	Bayer AG. Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmaceutska Družba d.o.o.	Nemačka; Italija; Slovenija	335,339.70	-	-	-	Lečenje primarnog karcinoma jetre (HCC) kod pacijenata sa lokalno odmaklom ili metastatskom bolešću gde nije bilo moguće primeniti hirurško niti bilo koje drugo lokoregionalno lečenje (BCLC C), ili je ovo lečenje bilo neuspešno (BCLC B), a pacijenti su sa očuvanom jetrinom funkcijom (Child-Pugh A) i u dobrom performans statusu (PS 0-1) (C22.0).	Odobrava se primena terapije za 2 meseca, nakon čega se sprovodi provera efikasnosti terapije. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
1039715	L01XE07	lapatinib	TYVERB ◊	film tableta	boca, 70 po 250 mg	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	124,159.10	-	-	-	Karcinom dojke - druga ili treća linija metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dojke, u kombinaciji sa lekom kapecitabin, kod pacijenata sa progresijom osnovne bolesti i PS 0-1, prethodno lečenih taksanima u kombinaciji sa anti HER2 terapijom, trastuzumab ± pertuzumab (u tom slučaju lapatinib je druga linija), kao i lekom trastuzumab emtanzin (u tom slučaju lapatinib je treća linija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
1039710	L01XE08	nilotinib	TASIGNA ◊	kapsula, tvrda	blister, 112 po 200 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	376,734.00	-	-	-	Druga terapijska linija kod bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
1039252	L01XE11	pazopanib	VOTRIENT◊	film tableta	bočica, 30 po 200mg	Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Španija; Velika Britanija	73,774.00	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.
1039253	L01XE11	pazopanib	VOTRIENT◊	film tableta	bočica, 60 po 400mg	Glaxo Wellcome S.A., Glaxo Wellcome Operations	Španija; Velika Britanija	295,096.20	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.
1039276	L01XE13	afatinib	GIOTRIF◊	film tableta	blister, 28 po 20mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG	Nemačka	203,812.80	-	-	-	Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova. - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.
1039277	L01XE13	afatinib	GIOTRIF◊	film tableta	blister, 28 po 30mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG	Nemačka	203,812.80	-	-	-	Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.
1039278	L01XE13	afatinib	GIOTRIF◊	film tableta	blister, 28 po 40mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG	Nemačka	203,812.80	-	-	-	Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039279	L01XE13	afatinib	GIOTRIF◊	film tableta	blister, 28 po 50mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG	Nemačka	203,812.80	-	-	-	Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo" KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039152	L01XE15	vemurafenib	ZELBORAF ◊	film tableta	blister, 56 po 240 mg	Roche S.P.A.	Italija	140,098.30	-	-	-	Monoterapija u primarnom sistemskom lečenju pacijenata sa uznapredovalim i/ili metastatskim BRAF pozitivnim melanomom kože PS 0-1 (C43).	Odobrava se primena dva ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
1039249	L01XE18	ruksolitinib	JAKAVI ◊	tableta	blister, 56 po 5mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	185,874.40	-	-	-	1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4). 2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
1039250	L01XE18	ruksolitinib	JAKAVI ◊	tableta	blister, 56 po 15mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	370,840.60	-	-	-	1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4). 2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
1039251	L01XE18	ruksolitinib	JAKAVI ◊	tableta	blister, 56 po 20mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	370,840.60	-	-	-	1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4). 2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
1069140	L01XX14	tretinoin	VESANOID ◊	kapsula, meka	bočica staklena, 100 po 10 mg	Cenexi; Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Francuska; Nemačka	30,370.20	-	-	-	Akutna mijeloidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
1039999	L01XX46	olaparib	LYNPARZA ◊	kapsula, tvrda	boca plastična, 448 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	601,365.10	-	-	-	Kao monoterapija u terapiji održavanja kod odraslih pacijentkinja sa relapsirajućim, osetljivim na platinu, BRCA-mutiranim (germinativnim i/ili somatskim) seroznim epitelijalnim karcinomom jajnika, jajovoda ili primarno peritonealnim karcinomom, visokog stepena, koji su postigli odgovor (potpun ili delimičan odgovor) na hemioterapiju zasnovanu na platini (C56; C57; C48).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1039602	L02BB04	enzalutamid	XTANDI ◊	kapsula, meka	blister, 112 po 40 mg	Astellas Pharma Europe B.V	Holandija	330,952.90	160mg	11,819.75	-	Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039721	L02BX03	abirateron	ZYTIGA ◊	tableta	boca, 120 po 250 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	343,851.00	1g	11,461.70	-	Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61). Lek se primenjuje sa prednizonom ili prednizolonom.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0328388	L03AB07	interferon beta 1a	REBIF	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mcg/0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	88,157.30	-	-	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328387	L03AB07	interferon beta-1a	REBIF	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	78,051.00	-	-	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328647	L03AB07	interferon beta 1a	AVONEX	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 4 po 0,5 ml (30 mcg/0,5 ml)	Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS	Danska	71,500.60	4,3 mcg	2,562.10	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015150	L03AB08	interferon beta 1b	BETAFERON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 15 po 1,2 ml (250 mcg/ml)	Bayer AG	Nemačka	82,798.30	4 Mi.j.	2,299.95	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328607	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	13,173.90	26 mcg	2,537.20	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja. 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je: a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci; b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml); c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze; d. viremija (HBV DNK) ≤ 10⁷ kopija /ml krvi	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328608	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	15,872.80	26 mcg	2,292.74	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja. 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je: a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci; b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml); c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze; d. viremija (HBV DNK) ≤ 10^7 kopija /ml krvi.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015120	L03AX13	glatiramer acetat	COPAXONE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK	Izrael, Holandija; Velika Britanija	71,795.10	20 mg	2,564.11	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015119	L03AX13	glatiramer acetat	COPAXONE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 12 po 1 ml (40mg/ml)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK	Holandija; Velika Britanija	52,218.50	20 mg	2,175.77	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015118	L03AX13	glatiramer-acetat	REMUREL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20mg/mL)	Synthon Hispania, S.L.; Synthon BV	Španija; Holandija	49,864.50	20 mg	1,780.88	-	Multipla skleroza.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015122	L03AX13	glatiramer-acetat	REMUREL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 12 po 1 ml (40mg/ml)	Synthon Hispania, S.L; Synthon B.V.	Španija; Holandija	51,769.40	20 mg	2,157.06	-	Multipla skleroza.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015121	L03AX16	pleriksafor	MOZOBIL	rastvor za injekciju	bočica, 1 po1,2ml; 20mg/ml	Genzyme Limited	Velika Britanija	649,425.90	16,8 mg	454,598.13	-	1.Kod pacijenata obolelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma koji su predhodno imali bar jednu neuspešnu mobilizaciju matičnih ćelija hematopoeze (prikupljeno<2x10⁶CD 34+/kg telesne mase) (Z94). 2. Kod pacijenata obolelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma kod kojih u toku mobilizacije, nakon 5 dana primene G-CSF-a, broj matičnih ćelija hematopoeze u perifernoj krvi nije dostigao odgovarajući nivo koji je potreban za ulazak u proces afereze (broj matičnih ćelija hematopoeze <20CD34+/µL periferne krvi) ili kod pacijenata koji su prikupili: <2x10⁶CD34+ ćelija/kg u manje od 3 aferezena postupka u okviru jedne mobilizacije (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista hematologije zdravstvene ustanove koja obavlja transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.
1014100	L04AA29	tofacitinib	XELJANZ	film tableta	blister, 56 po 5 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg	Nemačka	77,076.80	10 mg	2,752.74	-	Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Nazív proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014007	L04AA33	vedolizumab	ENTYVIO	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	300mg; bočica staklena, 1 po 300mg	Takeda Italia S.P.A.	Italija	163,002.00	-	-	-	1. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K-50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvecionalnu terapiju. 2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvecionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
1014032	L04AA37	bancitinib	OLUMIANT	film tableta	blister, 35 po 4 mg	Lilly, S.A.	Španija	96,331.50	-	-	-	Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014310	L04AB01	etanercept	ENBREL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 4 po 1ml (25mg/1ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	38,673.80	7 mg	2,707.17	-	1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to: a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i proširenu oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat; b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat; c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju 2.Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014312	L04AB01	etanercept	ENBREL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	77,290.80	7 mg	2,705.18	-	1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to: a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat; b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat; c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju 2.Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014313	L04AB01	etanercept	ENBREL	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	77,290.80	7 mg	2,705.18	-	1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to: a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat; b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat; c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju 2.Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014220	L04AB02	infliksimab	REMICADE	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 mg	Janssen Biologics B.V.	Holandija	40,335.10	3,75 mg	1,512.57	-	1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju; 2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju; 3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost boelsti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014204	L04AB02	infliksimab	REMSIMA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Biotec Services International Limited	Velika Britanija	22,256.40	3,75 mg	834.62	-	1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju 2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju; 3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost boelsti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci)	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014221	L04AB02	infliksimab	INFLECTRA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Hospira Enterprises B.V; Hospira Zagreb d.o.o.	Holandija; Republika Hrvatska	22,256.40	3,75 mg	834.62	-	1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju; 2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju; 3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost boelsti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014202	L04AB04	adalimumab	HUMIRA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 2 po 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	Abbvie Biotechnology GmbH	Nemačka	79,357.30	2,9 mg	2,876.70	-	1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to: a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat b) artritis povezan sa entezitisom kod pacijenata uzrasta 6 i više godina, koji nisu pružili odgovarajući odgovor ili koji su intolerantni na konvencionalnu terapiju 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju; 6. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014399	L04AB04	adalimumab	HUMIRA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	2 po 0,4 ml (40mg/0,4ml)	Abbvie Biotechnology Gmbh	Nemačka	79,357.30	2,9 mg	2,876.70	-	1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to: a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat b) artritis povezan sa entezitisom kod pacijenata uzrasta 6 i više godina, koji nisu pružili odgovarajući odgovor ili koji su intolerantni na konvencionalnu terapiju 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4 Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju; 6. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO
0014205	L04AB06	golimumab	SIMPONI	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni šprica, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)	Janssen Biologics B.V.	Holandija	86,121.90	1,66 mg	2,859.25	-	1. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci). 4. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO
0014207	L04AB06	golimumab	SIMPONI	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	1 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Janssen Biologics B.V.	Holandija	128,963.90	1,66 mg	2,140.80	-	Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014302	L04AC05	ustekinumab	STELARA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (45 mg/0,5 ml)	Janssen Biologics B.V.; Cilag AG	Holandija; Švajcarska	255,295.60	0.54 mg	3,063.55	-	1. Lek je indikovan za terapiju umerene do teške plak psorijaze (PASI≥10 i/ili BSA≥10 i/ili DLQI≥10) (Psoriasis Area and Severity Index, Body Surface Area, Dermatological Quality of Life Index) ili psorijazu sa lokalizacijom na licu/glavi ili genitalijama ili šakama/stopalima, kod odraslih osoba kod kojih nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kod kojih je primena sistemske terapije bila kontraindikovana ili koji ne podnose drugu sistemsku terapiju, uključujući acitretin, metotreksat ili PUVA fototerapiju (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9). 2. Teška forma hronične plak psorijaze (PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 10 i/ili BSA (Body Surface Area) ≥ 10 i/ili indeks kvaliteta života DLQI ≥ 10) kod adolescenata uzrasta 12 i više godina, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014305	L04AC05	ustekinumab	STELARA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (90 mg/ml)	Janssen Biologics B.V.; Cilag AG	Holandija; Švajcarska	255,295.60	0.54 mg	1,531.77	-	1. Lek je indikovan za terapiju umerene do teške plak psorijaze (PASI≥10 i/ili BSA≥10 i/ili DLQI≥10) (Psoriasis Area and Severity Index, Body Surface Area, Dermatological Quality of Life Index) ili psorijazu sa lokalizacijom na licu/glavi ili genitalijama ili šakama/stopalima, kod odraslih osoba kod kojih nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kod kojih je primena sistemske terapije bila kontraindikovana ili koji ne podnose drugu sistemsku terapiju, uključujući acitretin, metotreksat ili PUVA fototerapiju (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9). 2. Teška forma hronične plak psorijaze (PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 10 i/ili BSA (Body Surface Area) ≥ 10 i/ili indeks kvaliteta života DLQI ≥ 10) kod adolescenata uzrasta 12 i više godina, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014400	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	12,646.10	20mg	3,161.53	-	1. a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili obboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014401	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (200 mg/10 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	31,526.10	20mg	3,152.61	-	1. a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili obboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014402	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (400 mg/20 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	62,991.90	20mg	3,149.60	-	1. a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili obboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014410	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 4 po 0,9ml (162mg/0,9ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	97,876.70	20mg	3,020.89	-	Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014420	L04AC10	sekukinumab	COSENTYX	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 2 po 1 ml (150mg)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	116,050.90	10 mg	3,868.36	-	1.Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 2 Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci) 3. Lek je indikovan za terapiju umerene do teške plak psorijaze (PASI≥10 i/ili BSA≥10 i/ili DLQI≥10) (Psoriasis Area and Severity Index, Body Surface Area, Dermatological Quality of Life Index) ili psorijazu sa lokalizacijom na licu/glavi ili genitalijama ili šakama/stopalima, kod odraslih osoba kod kojih nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kod kojih je primena sistemske terapije bila kontraindikovana ili koji ne podnose drugu sistemsku terapiju, uključujući acitretin, metotreksat ili PUVA fototerapiju (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
1014022	L04AX04	lenalidomid	REVLIMID ◊	kapsula, tvrda	blister, 21 po 10 mg	Celgene Europe Limited; Celgen Distribution B.V.	Velika Britanija; Holandija	593,664.60	10mg	28,269.74	-	Revlimid u kombinaciji sa deksametazonom je indikovan za tretman multiplog mijeloma kod odraslih pacijenata koji su već primili najmanje jednu prethodnu terapiju, kod pacijenata kod kojih se ne može primeniti lečenje sa talidomidom i bortezomibom	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
1014024	L04AX04	lenalidomid	REVLIMID ◊	kapsula, tvrda	blister, 21 po 25 mg	Celgene Europe Limited; Celgen Distribution B.V.	Velika Britanija; Holandija	684,466.40	10mg	13,037.46	-	Revlimid u kombinaciji sa deksametazonom je indikovan za tretman multiplog mijeloma kod odraslih pacijenata koji su već primili najmanje jednu prethodnu terapiju, kod pacijenata kod kojih se ne može primeniti lečenje sa talidomidom i bortezomibom	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija.
0059086	M05BA06	ibandronat	BONDRONAT	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 6 mg/6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	11,309.10	6 mg	11,309.10	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059211	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOMETA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	5,238.20	4 mg	5,238.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059222	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOLEDRONATE PHARMASWISS	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,238.20	4 mg	5,238.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059010	M05BA08	zoledronska kiselina	ZITOMERA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (4mg/5ml)	Actavis Italy S.P.A	Italija	5,238.20	4mg	5,238.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059020	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 5 ml (4mg/5ml)	Hospira Enterprises B.V	Holandija	5,238.20	4 mg	5,238.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059214	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOLEDRONAT SANDOZ	koncentrat za rastvor za infuziju	plastična bočica,1 po 5ml (4mg/5ml)	Novartis Pharma Stein AG; Ebewe Pharma; Lek Farmaceutska družba D.D	Nemačka; Austrija; Slovenija	5,238.20	4 mg	5,238.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1079070	N07XX02	riluzol	RILUTEK	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Sanofi Winthrope Industrie	Francuska	14,032.90	0,1 g	501.18	-	1. Amiotrofična lateralna skleroza - AML (G12.2).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa ili neuropsihijatra Klinike za neurologiju KCS kod pacijenata koji nisu respiratorno ugroženi.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0099082	S01LA05	aflibercept	EYLEA ◊	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 0.1ml (40mg/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer, Farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	71,144.50	-	-	-	Za lečenje bolesnika sa dijabetičnim makularnim edemom koji zahvata centar makule (CSME) i kod kojih je fluoresceinskom angiografijom (FA) utvrđena prisutnost propuštajućih mikroaneurizmi smeštenih unutar 500 µm nedostupnih laserskoj fotokoagulaciji (FKG), bez znakova makularne ishemije, odnosno optičkom koherentnom tomografijom (OCT) potvrđeno centralno zadebljanje makule >350 µm sa elementima edema bez subretinalne fibroze i epimakularne membrane, sa vidnom oštrinom ≥ 0,5 (6/10) i vrednosti HbA1C ≤ 8.	Primena terapije se vrši u zdravstvenim ustanovama koje poseduju FA i OCT, a na osnovu mišljenja Komisije RFZO. Procena terapijskog odgovora se vrši nakon 3 meseca.

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
	A				
N002410	A02AB01	aluminium hydroxide	tableta	500 mg	Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega.
N002451	A03BA01	atropine sulfate [0]	injekcija	1 mg/1 ml	
N003822	A11EA..	vitamini B-kompleksa za parenteralnu primenu [0]	injekcija	-	-
N003798	A11JA..	retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol [0]	koncentrat za emulziju za infuziju	10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina starosti. STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
N002709	A12AA02	calcium gluconate	injekcija	10% a 10 ml	
N001016	A12CB01	zinc sulfate	tableta	20 mg	Willson-ova bolest
N001024	A12CC02	magnesium sulfate	infuzija	20% a 100 ml	
	B				
N003616	B01AB01	heparin	rastvor za injekciju	5000 I.J./0,25 ml	
N003970	B01AC05	tiklopidin	tableta	250 mg	1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
N003988	B01AD01	streptokinaza	injekcija/infuzija	250 000 i.j.	STAC
N003996	B01AD01	streptokinaza	injekcija/infuzija	750 000 i.j.	STAC
N004002	B01AD01	streptokinaza	injekcija/infuzija	1 500 000 i.j.	STAC
N001032	B02AA02	traneksaminska kiselina	tableta	500 mg	
N001040	B02AA02	traneksaminska kiselina [0]	injekcija	100 mg/ml	
N002469	B02BX01	etamsylate [0]	injekcija	250 mg/2 ml	
N003772	B05BA01	alanin, arginin, aspartanska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin [0]	rastvor za infuziju	100ml (6.3g/L+4.1g/L+4.1g/L+1g/L +7.1g/L+2.1g/L+2.1g/L+3.1 g/L+7g/L+5.6g/L+1.3g/L+2. 7g/L+5.6g/L+3.8g/L+300mg /L+3.6g/L+1.4g/L+500mg/L +3.6g/L)	STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002105	B05BA03	glucose	rastvor za infuziju	50%	
N003624	B05XA01	kalijum hlorid [0]	koncentrat za rastvor za infuziju	1mmol/ml	
N003632	B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat [0]	rastvor za infuziju	8,4%	
N003780	B05XC..	askorbinska kiselina, nikotinamid, natrijum-pantotenat, piridoksin, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, cijankobalamin [0]	prašak za rastvor za infuziju	10 ml (100mg+40mg+15mg+4mg +3.6mg+2.5mg+0.4 mg+60mcg+5mcg)	STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
	C				
N003855	C01AA05	digoksin [0]	rastvor za injekciju/infuziju	-	
N001065	C01BA01	quinidine sulfat	tableta	200 mg	
N001073	C01BA02	procainamide hydrochloride	injekcija	100 mg/ml	
N002477	C01BC03	propafenon	injekcija	35 mg/10 ml	
N001081	C01CA02	isoprenaline	injekcija	10 mg/5 ml	
N001099	C01CA03	noradrenalin [0]	injekcija	1 mg/ml	
N001107	C01CA06	phenilephrin	injekcija	10 mg/ml	
N003914	C01CA24	adrenalin hidrohlorid (epinefrin) [0]	rastvor za injekciju	1 mg/ml	
N002683	C01DA02	glyceryl trinitrate [0]	sublingvalna tableta	500 mcg	
N003004	C01DA02	glyceryl trinitrate	rastvor za injekciju	1 mg	
N003038	C01DA02	glyceryl trinitrate	rastvor za infuziju	1 mg	
N003012	C01DA02	glyceryl trinitrate [0]	koncentrat za rastvor za infuziju	5 mg	
N003491	C01DX12	molsidomin [0]	tableta	2 mg	
N003509	C01DX12	molsidomin [0]	tableta	4 mg	Angina pektoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.
N003517	C01DX12	molsidomin [0]	tableta sa produženim oslobađanjem	8 mg	Teška (ozbiljna) angina pektoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina.
N002311	C01EA01	alprostadil	injekcija	500 mcg	
N001115	C02DA01	diazoksid	kapsula	25 mg	
N001123	C02DA01	diazoksid	injekcija	15 mg/ml	
N001131	C02DD01	natrijum nitroprusid	injekcija	50 mg	
N003178	C03CA01	furosemid [0]	tableta	40 mg	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.
N003186	C03CA01	furosemid [0]	rastvor za injekciju	20 mg/2ml	-
N001149	C03DB01	amilorid	tableta	5 mg	
N001156	C04AX02	phenoxybenzamin	kapsula	10 mg	
N001164	C04AX02	phenoxybenzamin	injekcija	50 mg/ml	
N002626	C10AC01	colestyramine	prasak	4 g	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
	D				
N002485	D05BA02	methoxsalen	tableta	10 mg	
N003905	D05BB02	acitretin	kapsula	10mg	Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.
N003913	D05BB02	acitretin	kapsula	25mg	Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.
	G				
N003863	G02AB01	metilergometrin [0]	rastvor za injekciju	0,1 mg/ml	
N003871	G02AB01	metilergometrin [0]	rastvor za injekciju	0,2 mg/ml	
N003947	G02CA03	fenoterol	injekcija/ infuzija		
N002949	G02CB03	cabergolin	tableta	0,5 mg	Tumori hipofize - za osobe koje imju izražene neželjne efekte na prethodnu terapiju bromokriptinom.Lek se uvodi u terapiju na osnovu konzilijarnog mišljenja tri lekara endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004010	G03GA01	horionski gonadotropin	injekcija	5000 i.j./mL	Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
N003210	G03GB02	klomifen	tableta	50 mg	Za indukciju ovulacije kod anovulatorne i oligoovulatorne neplodnosti kod žena (N97).
N003277	G04BE03	sildenafil [0]	tableta	20 mg	Plućna hipertenzija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
	H				
N001206	H01AA01	corticotrophin-releasing factor-CRF	injekcija	25 IU	
N001214	H01AA02	tetrakozaktid	injekcija	1 mg/ml	
N002493	H01BA02	dezmopresin	injekcija	4 mcg/1ml	
N002501	H01BA02	dezmopresin	injekcija	20 mcg/1ml	
N001222	H01CA01	gonadorelin	injekcija	100 mcg	
N001263	H02AA02	fludrocortizon	tableta	0,1 mg	
N003731	H02AB02	deksametazon [0]	tableta	4 mg	
N004127	H02AB04	metilprednizolon [0]	suspenzija za injekciju		
N002634	H02AB09	hidrokortizon	tablete	10 mg	
N002923	H02AB09	hidrokortizon	prašak za injekciju	100 mg	
N002931	H02AB09	hidrokortizon	prašak za injekciju	500 mg	
	J				
N002121	J01BA01	hloramfenikol	injekcija	1000 mg	
N002907	J01CE01	benzilpenicilin [0]	prašak za injekciju	1 MIU	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002915	J01CE01	benzilpenicilin	prašak za injekciju	5 MIU	
N001289	J01CE08	benzatinbenzilpenicilin	injekcija	1,2 MIU	
N001297	J01CE08	benzatinbenzilpenicilin	injekcija	2,4 MIU	
N001305	J01CF02	cloxacillin	injekcija	500 mg	
N003806	J01CR01	ampicilin, sulbaktam	prašak za rastvor za injekciju	1000 mg + 500 mg	
N003962	J01CR05	piperacilin, tazobaktam °	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	4 g + 0,5 g	**
N001313	J01EC02	sulfadiazin	tableta	500 mg	
N001321	J01FA01	eritromicin	injekcija	1000 mg	
N002865	J01GA01	streptomycin sulfat	prašak za injekciju	1 g	Tuberkuloza (A15)
N002139	J01GB04	kanamycin	injekcija	1000 mg	
N003657	J02AA01	amfotericin B	rastvor za infuziju (lipidni kompleks)	50 mg	
N003665	J02AA01	amfotericin B	rastvor za infuziju (lipidni kompleks)	100 mg	
N002733	J02AA01	amfotericin B	rastvor za infuziju	50 mg	
N001339	J02AA01	amfotericin B (sa liposomima) °	injekcija	50 mg	
N002147	J04AA01	p - aminosalicylici acid	tableta	500 mg	
N002154	J04AA01	p - aminosalicylici acid	granula	4 g	
N002162	J04AB01	cycloserine	kapsula ili tableta	250 mg	
N002329	J04AB02	rifampicin	kapsula ili tableta	150 mg	
N002170	J04AB30	capreomycin	injekcija	1000 mg	
N002337	J04AC01	izoniazid	tableta	100 mg	
N002519	J04AC01	izoniazid	tableta	300 mg	
N002188	J04AD03	ethionamide	tableta	125 mg	
N002196	J04AD03	ethionamide	tableta	250 mg	
N001347	J04AK01	pyrazinamide	tableta	400 mg	
N001354	J04AK02	etambutol	tableta	400 mg	
N004101	J04AK05	bedaquiline	tableta	100 mg	
N004119	J04AK06	delamanid	tableta	50 mg	
N002675	J04BA02	dapsone	tablete	50 mg	
N002741	J05AE03	ritonavir	oralni rastvor	80 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002758	J05AE07	fosamprenavir	oralna suspenzija	50 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002766	J05AE09	tipranavir	oralni rastvor	100 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002774	J05AR10	lopinavir, ritonavir	oralni rastvor	80 mg/ml + 20 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N003020	J05AF01	zidovudin	oralni rastvor	50 mg/5 ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002782	J05AF04	stavudin	prašak za oralnu suspenziju	1 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002808	J05AF05	lamivudin	oralni rastvor	10 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002816	J05AF06	abakavir	oralni rastvor	20 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N001362	J06AA01	diphtheria antitoxin	injekcija	10000 IU	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002204	J06AA01	diphtheria antitoxin	injekcija	20000 IU	
N004069	J06BB03	varičela-zoster imunoglobulin	rastvor za injekciju/infuziju		Prema programu obavezne imunizacije.
N004077	J07AG01	vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B [0]	injekcija		Prema programu obavezne imunizacije.
N004085	J07AL01	vakcina protiv pneumokoka, polivalentna	rastvor za injekciju		Prema programu obavezne imunizacije.
	L				
N001396	L01AA01	cyclophosphamide	tableta	50 mg	
N002212	L01AA02	hlorambucil	tableta	2 mg	
N001404	L01AA03	melphalan [0]	injekcija	50 mg	
N002220	L01AA03	melphalan	tableta	2 mg	
N001412	L01AA05	chlormethine(cariolyzin)	injekcija	10 mg	
N003699	L01AA09	bendamustin	prašak za rastvor za infuziju	25 mg	Hronična limfocitna leukemija.
N003707	L01AA09	bendamustin	prašak za rastvor za infuziju	100 mg	Hronična limfocitna leukemija.
N002238	L01AB01	busulfan	tableta	2 mg	
N001438	L01AC01	thiotepa	injekcija	15 mg	
N001446	L01AD01	karmustin	injekcija	100 mg	
N001453	L01AD02	lomustin	tableta	40 mg	
N002964	L01AX04	dakarbazin [0]	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	100 mg	
N002972	L01AX04	dakarbazin [0]	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	200 mg	
N002246	L01BB02	merkaptopurin	tableta	50 mg	
N003525	L01BB03	tioguanin	tableta	40 mg	Akutna leukemija, limfoblastni limfom kod dece i odraslih (C91.0; C92.0; C83.5).

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N004051	L01BB05	fludarabin [0]	injekcija/infuzija	50 mg	Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom). STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
N003111	L01BC02	fluorouracil [0]	rastvor za injekciju	50 mg/ml	
N003129	L01BC02	fluorouracil [0]	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	250 mg/5 ml	
N003137	L01BC02	fluorouracil [0]	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	500 mg/10 ml	
N003152	L01BC02	fluorouracil [0]	rastvor za injekciju/infuziju	1000 mg/20 ml	
N003202	L01BC02	fluorouracil [0]	rastvor za injekciju/infuziju	5000 mg/100 ml	
N003848	L01CA01	vinblastin	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 mg/5 ml	
N001479	L01DA01	daktinomicin	injekcija	0,5 mg	
N003467	L01DB07	mitoksantron [0]	koncentrat za rastvor za infuziju	10 mg/5 ml	
N003475	L01DB07	mitoksantron [0]	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/10 ml	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002428	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 5 mg	
N002527	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 10 mg	
N002436	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 20 mg	
N001487	L01XB01	procarbazine hydrochloride	kapsula	50 mg	
N001495	L01XX02	l-asparaginase	injekcija	10000 IU	
N001503	L01XX23	mitotane	tableta	500 mg	Karcinom nadbubrežne žlezde
N002253	L02AB02	medroksiprogesteron	tableta	100 mg	
N004093	L03AB04	interferon alfa- 2a	injekcija	-	1. Hronična mijeloidna leukemija. 2. Triholeukemija. 3. Održavanje remisije multiplog mijeloma. 4. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrine tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.
N003608	L03AX03	atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG	prašak za intravezikalni rastvor	-	
N002360	L04AX02	thalidomide	tableta	100 mg	Multipli mijelom
	M				
N001511	M01CC01	penicillamine	kapsula	250 mg	Willson-ova bolest
N003145	M03AC01	pankuronijum	rastvor za injekciju	4 mg/2 ml	
N003285	M03BX01	baclofen	tableta	5 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003293	M03BX01	baclofen	tableta	10 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003301	M03BX01	baclofen	tableta	25 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003319	M03BX01	baclofen	injekcija	0,05 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003327	M03BX01	baclofen	infuzija	0,05 mg/2 ml	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N001529	M09AA01	quinine dihydrochloride	injekcija	600 mg/2 ml	
	N				
N001537	N01AF03	thiopenthal [D]	injekcija	0,5 g	
N001545	N01AX03	ketamin	injekcija	50 mg/1 ml	
N001552	N01BB02	lidocain	sprej	10%	
N001560	N01BB52	lidocain, epinephrin	krema	2,50%	
N003749	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	10 mg	Samo za decu.
N003756	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	30 mg	Samo za decu.
N003764	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	60 mg	Samo za decu.
N001610	N03AB02	phenytoin	injekcija	250 mg	
N001628	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	25 mg	
N001636	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	50 mg	
N001644	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	100 mg	
N004028	N03AE01	klonazepam	injekcija/infuzija	1 mg/mL	
N003921	N03AG01	valproinska kiselina	injekcija/infuzija	100 mg/ml	
N002543	N03AG04	vigabatrin	kapsula	500 mg	Epilepsija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003335	N03AX03	sultiame	tableta	50 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003343	N03AX03	sultiame	tableta	200 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003350	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	25 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003368	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	50 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003376	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	100mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003384	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	300 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N001677	N05AA02	levomepromazin	tableta	100 mg	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003889	N05AB02	flufenazin [0]	rastvor za injekciju	25 mg /ml	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
N003079	N05AN01	litijum karbonat	kapsula	300 mg	
N002956	N05BA09	clobazam	tableta	10 mg	Epilepsija (G40)
N003392	N05BA09	clobazam	tableta	20 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003400	N05CC01	chloralhydrate	oralni rastvor	100 mg/ml	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003418	N05CC01	chloralhydrate	kapsula	250 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003426	N05CC01	chloralhydrate	kapsula	500 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003681	N05CD08	midazolam	rastvor za bukalnu primenu	10 mg/ml	Terapija prolongiranih akutnih konvulzivnih napada kod dece starosti od 3 meseca do 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004036	N06AA04	klomipramin	rastvor za injekciju	25mg/2mL	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003434	N06BX03	piracetam	oralni rastvor	333mg/ml	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003442	N06BX03	piracetam	granule	2,4 g	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N002691	N07AA01	neostigmin	rastvor za injekciju	0,5 mg/ml	
N001669	N07AA01	neostigmin [0]	injekcija	2,5 mg/ml	
	P				
N001685	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	100 mg	
N001693	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	150 mg	
N001701	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	250 mg	
N001719	P01BA02	hidroxychloroquine	tableta	200 mg	
N001727	P01BA03	primaquin diphosphate	tableta	15 mg	
N001735	P01BB01	proguanil hydrochloride	tableta	100 mg	
N001743	P01BC01	quinine bisulfat ili sulfat	tableta	300 mg	
N001750	P01BC02	mefloquine hydrochloride	tableta	250 mg	
N001768	P01BD01	pyrimethamin sulfat	tableta	25 mg	
N001776	P01BE02	artemether	injekcija	80 mg/ml	
N001784	P01BE02	artemether	tableta	20 mg	
N001792	P01BE03	artesunat	tableta	50 mg	
N001800	P02BA01	praziquantel	tableta	150 mg	
N001818	P02BA01	praziquantel	tableta	600 mg	
N002642	P02CA01	mebendazol	tableta	100 mg	
N002659	P02CA03	albendazol	tableta	200 mg	1. Ehinokokoza, 2. Cisticerkoza
N001826	P02CB02	diethylcarbamazine dihydrogen citrate	tableta	50 mg	
N002279	P02CB02	diethylcarbamazine dihydrogen citrate	tableta	100 mg	
N001834	P02CF01	ivermectin	tableta	3 mg	
N001842	P02CF01	ivermectin	tableta	6 mg	
N001859	P02DA01	niclosamid	tableta	500 mg	
N002873	P03AX01	benzyl benzoate	losion	25%	
	R				
N001867	R03BB01	ipatropium bromid	ampula za inhalaciju	0,25 mg/1 ml	
N001875	R03CC02	salbutamol	injekcija	1 mg/ml	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003160	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju/infuziju	250 mg/10 ml	
N003483	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju/infuziju	240 mg/10 ml	
N004044	R06AC03	hloropiramin [0]	rastvor za injekciju	20 mg/2 ml	
	S				
N003087	S01EB01	pilokarpin [0]	kapi za oči	2%	
N001891	S01EC01	acetazolamide	tableta	250 mg	
N001909	S01EC01	acetazolamide	injekcija	500 mg	
N003095	S01FA01	atropin	kapi za oči, rastvor	0.50%	
N003103	S01FA01	atropin	kapi za oči, rastvor	1%	
	V				
N002535	V03AB	trientine	kapsula		Willson-ova bolest
N003640	V03AB14	protamin [0]	rastvor za injekciju	50 mg/5 ml	
N001917	V03AB15	naloxon hydrochloride	injekcija	0,4 mg/ml	
N001925	V03AC01	deferoxamine mesilat	injekcija	500 mg	
N001933	V03AF01	mesna (uromiteksan)	injekcija	400 mg	
N002584	V04CD01	metyrapone	kapsula	250 mg	Cushingov sindrom na osnovu mišljenja tri lekara Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS - Beograd.
N001941	V04CJ02	protirelin	injekcija	0,2 mg	
N001958	V04CJ02	protirelin	injekcija	0,4 mg	
N003673	V08BA02	barijum sulfat [0]	suspenzija	1 g/ml	

[0] Lek se nabavlja samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica RFZO-a.

LEGENDA I SKRAĆENICE

**

Rezervni antibiotik propisuje se na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine koje imenuje direktor zdravstvene ustanove uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene ustanove. Evaluaciju primenjene terapije u pisanoj formi potrebno je uraditi nakon tri dana od strane istih lekara uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene ustanove nakon uvida u antibiogram.

Izuzetno, u hitnim slučajevima dežurni ili odeljenski lekar može uvesti rezervni antibiotik u terapiju, nakon čega je u obavezi da pribavi predhodno navedeni uslov za primenu rezervnog antibiotika.

STAC

Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost.

STAC**

Lekovi sa ovom oznakom obeležavaju antibiotike koji se priznaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost, kao i u toku ambulatnog lečenja pod uslovom da je na opusnoj listi utvrđena dalja terapija ovim lekom.

◊

Lek primenjuju osigurana lica filijala u sledećim zdravstvenim ustanovama:

1. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, Klinika za urologiju KC Srbije, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa

- Mačvanski okrug sa sedištem u Šapcu; Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu; Podunavski okrug sa sedištem u Smederevu; Braničevski okrug sa sedištem u Požarevcu; Borski okrug sa sedištem u Boru; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu; Grad Beograd,

2. Klinika za onkologiju KC Niš, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, Klinika za plućne bolesti „Knez Selo" KC Niš

- Zaječarski okrug sa sedištem u Zaječaru; Rasinski okrug sa sedištem u Kruševcu; Nišavski okrug sa sedištem u Nišu; Toplički okrug sa sedištem u Prokuplju; Pirotski okrug sa sedištem u Pirotu; Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu; Pčinjski okrug sa sedištem u Vranju; Kosovski okrug sa sedištem u Gračanici; Kosovsko-mitrovački okrug sa sedištem u Zvečanu; Kosovsko-pomoravski okrug sa sedištem u Ranilugu,

3. Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za urologiju KC Vojvodine

- Srednje-banatski okrug sa sedištem u Zrenjaninu; Severno-bački okrug sa sedištem u Subotici; Severno-banatski okrug sa sedištem u Kikindi; Južno-bački okrug sa sedištem u Novom Sadu; Zapadno-bački okrug sa sedištem u Somboru; Sremski okrug sa sedištem u Sremskoj Mitrovici; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu,

4. KC Kragujevac

- Šumadijski okrug sa sedištem u Kragujevcu; Pomoravski okrug sa sedištem u Jagodini; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku,

5. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić", Univerzitetska dečja klinika, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš

- osigurana lica do 18 godina starosti,

6. Vojnomedicinska akademija

- Mačvanski okrug sa sedištem u Šapcu; Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu; Podunavski okrug sa sedištem u Smederevu; Braničevski okrug sa sedištem u Požarevcu; Borski okrug sa sedištem u Boru; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu; Grad Beograd."